

Odeur.—Elle est due surtout à la décomposition des matières grasses; elle est de peu d'importance, ne variant qu'en intensité et non en qualité; elle est très pénétrante dans les affections inflammatoires et ulcéreuses. (Guttmann, Berlin.)

La couleur et l'odeur des selles diarrhéiques, comme la couleur et l'odeur des crachats pneumoniques, jouent un rôle important dans le diagnostic des lésions organiques.

Généralités.—L'anatomie pathologique ne pouvant, dans un grand nombre de cas, constater de lésions organiques, il nous faut conclure que la diarrhée peut être essentiellement fonctionnelle, *sine materiâ*.

Les lésions se rencontrent surtout dans le gros intestin; l'estomac et l'intestin grêle en présentent cependant. La marche de la maladie ne peut nous faire connaître suffisamment la nature de la lésion; seulement nous pouvons dire d'une manière générale que lorsque les selles sont intermittentes, la diarrhée est d'ordre réflexe ou fonctionnelle; quand les selles sont violentes et continues, la diarrhée est inflammatoire, nous avons affaire à une affection grave et aiguë de l'intestin.

La diarrhée dyssentérique est très fréquente; la dysenterie elle-même, rare; il en est de même de la diarrhée cholériforme, le choléra n'étant presque jamais constaté.

Quand les selles sont très liquides, comme séreuses, s'infiltrant presque tout entières dans les luges sans laisser de résidu à la surface de ceux-ci, elles viennent de l'intestin grêle.

Ces distinctions sont importantes au point de vue du traitement, qui ne saurait être le même dans tous les cas. L'on sait, en effet, combien il faut une médication moins énergique lorsque nous traitons des troubles gastriques ou du premier intestin, quo lorsqu'il nous faut attaquer le gros intestin; quelques gouttes de chlorodyne dans le premier cas donneront une satisfaction que l'on attendrait inutilement dans le dernier: des médicaments promptement diffusibles ne sauraient exercer une action égale sur tout le parcours des voies digestives.

Les formes de la diarrhée sont nombreuses; nous les classifions d'après la nature des selles.

Diarrhée. Selles lientériques.—La digestion est incomplète, les aliments ne sont pas digérés, on les trouve dans les selles; les sécrétions des sucs gastrique, biliaire ou pancréatique, séparément ou conjointement ont été sans action, ont cessé de jouer leur rôle.

La diarrhée lientérique est une diarrhée fonctionnelle; elle est très fréquente parmi nous. Causée par un lait qui n'a pas toujours les qualités nécessaires, une alimentation artificielle donnée avant l'âge nécessaire, des troubles nerveux, résultat d'une dentition difficile, elle est caractérisée par deux choses principales: la non-digestion des aliments et l'acidité des selles au bout de quelques jours.