

MEMOIRES

DEUX CAS DE GASTROENTEROSTOMIE POUR STENOSE DU PYLORE CONSECUTIVE A L'ULCERE SIMPLE.

Nous avons eu à observer à la demande de monsieur le docteur Arthur Simard deux gastropathes, et nous avons communiqué ces deux observations à la Société Médicale de Québec avec quelques considérations sur l'ulcération. Sur un vœu émis par les sociétaires nous avons rédigé les notes que nous avons prises et nous les présentons aujourd'hui aux lecteurs du Bulletin Médical.

X.. 31 ans, 134 lbs, issu d'une famille de gastropathes, souffre de son estomac depuis l'âge de 11 ans. Le malade s'est mal observé, il renseigne mal sur son état antérieur à ces deux dernières années. Nous nous croyons toutefois en droit de conclure à une forme d'ulcère à répétition. Depuis deux ans les douleurs ont changé. Ce ne sont plus des douleurs très vives, elles sont continues, le malade a la sensation de tiraillement dans le dos et dans l'hypochondre droit. Il vomit presque tous les jours. Jusqu'à il y a 6 mois, le régime lacté l'a soulagé, mais aujourd'hui rien n'y fait, il souffre continuellement. Il vomit le matin à jeun et reconnaît facilement des aliments pris 4 ou 5 jours auparavant. L'amaigrissement est considérable (40 lbs). Nous revoyons le malade à jeun le lendemain; l'estomac clapote et fluctue largement jusqu'à trois travers de doigts au dessous de l'ombilic; le point épigastrique est très douloureux. Nous