

- terminales; tige feuillue; toute la plante odorante.—Graines; vent.
—Prairies, pâturages, Défoncer, biner.
- Immortelle des vases; Low Cudweed.—*Gnaphalium uliginosum*, L., indigène.—1 an, 4-8 pcs.—Peu apparentes; en grappes feuillées terminales.—Graines; portées par les eaux.—Terrains bas, champs, prairies et pâturages.—Drainer parfaitement.
- Herbe de pauvreté; Poverty Weed.—*Iva axillaris*, Pursh, indigène.—Vivace, 6-12 pcs.—Peu apparentes, 1/8 pc., pendantes à courts pédoncules, aux aisselles des feuilles supérieurs; feuilles de moins de 1 pc., rudes, linéaires oblongues, entières, les inférieurs opposées, les supérieures alternes.—Tige souterraines très nombreuses.—Champs de grain.—Jachérer, biner constamment.
- Fausse Herbe aux poux; False Ragweed.—*Iva xanthiifolia*, Nutt., indigène.—1 an, 1-4 pds.—Vert, 1/4 pc.—grandes panicules terminales denses; tiges lisses.—Graines portées par le vent et les eaux.—Champs de grain, bords des chemins.—Arracher, faucher.
- Grande Herbe aux poux; Great Ragweed.—*Ambrosia trifida*, L., indigène.—Jaune, 1/4 pc.; fleurs stériles en grappes ou épis terminaux; fleurs fertiles à la base des épis; tiges rudes; graines 1/4 pc., à couronne de 5-1 tubercules; feuilles à 3 lobes.—Graines, dans le grain, portées par le vent et les eaux.—Terres riches basses, champs de grain, blé.—Arracher, faucher, brûler les vieilles plantes.
- Herbe aux poux; Ragweed.—*Ambrosia artemisiifolia*, L., indigène.—1 an, 1-3 pds.—Jaune, 1/8 pc., fleurs stériles en grappes; fleurs fertiles vertes, auxiliaires, graines 1/8 pc., à coutres épineuses aiguës; feuilles finement découpées.—Graines, dans le grain, portées par le vent et les eaux.—Terrains cultivés riches, bords des chemins.—Biner tard, faucher les chaumes.
- Herbe aux poux vivace; Perennial Ragweed.—*Ambrosia psilostachya*, DC., indigène.—Vivace, 1-2 pds.—Jaune, 1/6 pc.; fleurs stériles en grappes; fleurs fertiles vertes, axillaires; graines 1/8 pc., poilues, sans épines; plante vert grisâtre.—Graines, tiges souterraines.—Terrains cultivés.—Jachérer tôt, biner profondément.
- Lampourde glouteron; Cocklebur.—*Xanthium strumarium*, L., Europe. 1 an, 1-2 pds.—Vert, 1/4 pc.; en têtes globuleuses; feuilles triangulaires, dentées, rudes; graines dans coque épineuse à 2 cellules, de 1/2 pc., surmontée de 2 épines crochues.—Graines, coques portées par animaux.—Champs bas; laine.—Faucher, brûler les vieilles plantes, biner.
- Marguerite orange; Blackeyed Susan.—*Rudbeckia hirta*, L., indigène.—Vivace, 1-3 pds.—Orange et violet, 2 pcs.; toute la plante très rude.