

LE CHEZ-NOUS du MARAICHER

Les couches-chaudes

Abris, cadres et châssis

Il y a certainement une grande différence entre une couche-chaude faite pendant la première quinzaine de mars et une autre faite trois semaines ou un mois plus tard. Cependant, malgré la mauvaise saison, celui qui veut récolter des produits hâtifs doit commencer ses semis assez tôt pour pouvoir arriver tout au moins aussi vite que ses voisins.

Bon nombre de jardiniers ont leurs serres, où le chauffage, la surveillance et l'élevage des plants est beaucoup plus facile à réaliser qu'en couches. Pour le jardinier ou l'amateur qui sont obligés de compter sur les couches-ci ou les pour leurs primeurs, il y a une foule de conditions qu'il ne faut point négliger, car on risque de manquer les premiers semis, et il peut en résulter un retard de 15 jours à trois semaines, retard très préjudiciable au moment de la récolte.

L'emplacement à cette époque de l'année a une grosse importance, il doit

être choisi avec soin, être bien abrité des vents dominants, recevoir le soleil toute la journée, il faut en outre qu'il soit établi sur une terre bien poreuse et même légèrement surélevée, de manière qu'il n'y ait jamais d'eau qui baigne le fumier même légèrement.

Nous croyons devoir insister d'une façon particulière sur la protection des premières couches-chaudes, au moyen d'abri naturel ou artificiel, ce sont ces couches qui donneront les premiers produits de primeurs, ce sont elles qui serviront à partir les plants qui donneront les primeurs de pleine terre, il ne faut donc rien négliger pour obtenir le plus de chaleur possible. Chaque année, elles sont faites à la même place, il est donc facile d'établir des abris en permanence, et les dépenses encourues seront peu de choses en comparaison des résultats que l'on pourra obtenir. Ces abris peuvent être formés par les bâtisses, les murs,

Hémorroïdes

Pour un Demi Siècle le Meilleur

Traitement pour cette Maladie a été

L'ONGUENT du Dr CHASE

les clôtures, et même les rideaux d'arbres plantés sur une ou deux lignes très rapprochées l'une de l'autre. Dans les terres compactes imperméables, où l'on ne craint que l'eau séjourne le printemps, il est souvent avantageux d'avoir un bon fossé qui permettra d'écouler l'excès d'eau.

C'est surtout en arrêtant les vents froids que les brise-vents ou rideaux d'arbres ont leur utilité. L'arrêt d'un vent froid a pour effet de régulariser la température et l'écart de température entre une partie protégée et qui ne l'est pas peut varier de 10 à 12 degrés et même quelquefois plus. Lorsque les couches sont bien protégées, il s'établit une sorte d'équilibre de température, qui, n'étant point troublée par les vents froids, est très favorable aux plantes et facilite l'entretien des couches.

Dans bien des cas, il arrive que les endroits, où se font les couches, sont difficiles à égoutter, le terrain est bas, et même avec des fossés, l'eau reste sur le terrain. Dans ces conditions, il n'y a pas d'hésitation possible, il faut former une place spéciale pour les premières couches, et former une place assez élevée pour qu'il n'y ait jamais d'eau. Souvent, quelques voyages de bonne gravelle seront suffisants pour former un emplacement capable de recevoir cinq à six bonnes couches.

Dans ces couches de primeurs, il faut aussi apporter un soin particulier au cadre de la couche, et si une planche d'un pouce peut suffire pour les couches du mois d'avril, il n'en est pas de même des primeurs de mars. A cette époque, le cadre doit être fait de deux pouces d'épaisseur, la longueur et la largeur restent la même, 12 pieds de longueur par

6 de large, avec une hauteur de 10 à 12 pouces à l'avant, et de 14 à 16 à l'arrière. Les châssis se trouvent à avoir trois par six, et ils doivent être vitrés en verre semi-double qui donne plus de chaleur que le verre simple. Il arrive assez souvent que l'on peut avoir des vitres assez bon marché, en se servant de rognures que l'on trouve assez facilement dans le commerce, il en faut un p u s grand nombre, mais la solidité du châssis peut y gagner.

Ces châssis peuvent durer fort longtemps, s'ils sont bien entretenus, il y a donc tout intérêt à prolonger leur durée. A cet effet, ils sont peints de plusieurs couches de peinture de préférence gris clair. Nous verrons dans un prochain article comment monter la couche, pour qu'elle conserve sa chaleur le plus longtemps possible.

G. BILLAULT,

Secrétaire-correspondant des
Jardiniers-maraîchers.LA CAMPAGNE
CANADIENNE

La Campagne Canadienne est en vente dans les principales librairies de Québec et de Montréal. On peut l'obtenir directement de l'Imprimerie du Messager, 4260, rue de Bordeaux, Montréal, aux conditions suivantes:

75 sous l'exemplaire broché; 85 sous par la poste.

\$6.00 la douzaine; \$40.00 le cent.

Relié en toile, \$1.25 l'exemplaire.

Relié en cuir, \$1.50 l'exemplaire.

édition illustrée, format livre de prix:


\$1.50 l'exemplaire, \$10.00 pour 10 exemplaires.

"FRIEND"

Les VAPORISATEURS pour les VERGERS PRODUCTEURS

La plus importante question que vous vous poserez bientôt est: Quels seront les revenus en dollars et centimes de ma prochaine récolte? Si vos arbres fruitiers sont arrosés, ils vous rapporteront certainement deux et trois fois plus que s'ils ne l'étaient pas, simplement parce que vos fruits se vendront aux plus hauts prix du marché et que votre récolte sera beaucoup plus abondante.

Faites venir notre catalogue 1927.



Représentant pour Québec

ARTHUR GADBOIS,

Rougemont, P. Q.

Assortiment complet des vaporisateurs "FRIENDS" et pièces de rechange.

Succursale au Canada

"FRIEND" MFG. Co.,

NIAGARA FALLS,
ONTARIO

RAPPORTS TÉLÉGRAPHIQUES OFFICIELS SUR
LES MARCHÉS DE MONTRÉAL

LE 17 FÉVRIER 1927.

MONTRÉAL.

Le commerce s'améliore.

Marché des oignons, soutenu et ferme.

Marché des pommes de terre, tranquille, avec entropôt qui diminue graduellement.

Les pommes de terre arrivent des districts de Québec, seulement.

Marché des pommes, ferme, l'entropôt des pommes en baril est d'une meilleure demande, et celui en caisse est soutenu.

Pommes de terre du N. B. blanches, 80 lbs. Canada "A" \$ 1.50 à \$ 1.75

de Québec, blanches, 80 lbs. Canada "A" 1.35 à 1.50

Oignons rouges, échantillon, 70 lbs. 2.75 à 3.00

régulier, d'Ont. qt. 4.00 à 4.50

jaunes, échantillon, d'Ont. qt. 3.50

Pommes de C. B. McIntosh, caisse, très belles, 3.25 à 3.50

Pommes de C. B. McIntosh, caisse, belles, 3.00 à 3.25

Importés:

Oignons rouges, régulier, qt. 4.00 à 4.50

Oignons espagnols, caisse, beaux, 4.50 à 5.00

Laitue Iceberg, cageot, 3.25 à 3.75

Épinards, panier, 1.25 à 1.35

Carottes, betteraves, Nouveau panier, 1.75 à 2.25

Navets, nouveau panier, 2.25 à 2.50

Céleri de Californie, cageot, 5.50 à 6.50

Céleri de Floride, cageot, 3.25 à 3.50

Tomates, panier, 4.50

Choux, cageot de 115 lbs. 4.25

Choux, baril, 4.00

Choux-fleurs, baril, 3.00

Patates sucrées, panier, 2.25

Fraises, Floride, pinte, 1.25

Arrivages de wagons du 9 au 16 inclusivement:

N. S. 4 de pommes.

Québec, 35 de pommes de terre.

Ont. 3 de pommes, 6 d'oignons.

Importés:

3 de pommes, 2 d'oignons, 4 de bananes, 30 d'oranges, 6 de légumes mélangés, 9 de laitue, 6 d'épinards, 4 de pommes de terre, 4 de pampelmousses, 4 de citrons,

4 de choux, 5 de céleri, 1 de pois verts, 1 de choux-fleurs, 1 d'ananas, 1 de patates sucrées.

QUÉBEC:

Commerce passable.

Le prix des pommes de terre est plus bas, celui des oignons, plus haut.

Pommes de N. E. baril, \$ 3.00 à \$ 4.50

Pommes de terre de Québec, blanches, Canada "A", qt. 1.60

Pommes de terre de Québec, blanches, Canada "B", qt. 1.50

Carottes, sac de 70 lbs. 1.10 à 1.20

Betteraves, sac, 1.30

Navets, sac, 1.00

Choux, 90

Laitue de serre, douz. 1.10

Oignons rouges, Globe, régulier, d'Ont. qt. 4.50

Oignon jaunes, échantillon, d'Ont. qt. 4.50

Oignons jaunes, échantillon, d'Ont. qt. 3.75

Importés:

Oignons espagnols, cageot choisi, 5.50

Céleri de Californie, cageot de 5 douz. 8.50 à 9.00

Céleri de Floride, cageot de 3 douz. 4.50

Choux-fleurs, cageot d'une douz. 3.50

Laitue Iceberg, cageot, 6.00

Tomates du Mexique, cageot, 5.75

Arrivages de wagons du 10 au 16 inclusivement:

Québec, 1 de choux.

Importés:

2 d'oranges, 1 de citrons, 1 de pampelmousses.

J.-H. L.

LE CH

Le

Résumé de la
vincial, au

Le succès en l'agriculture dépend de facteurs parmi de la récolte est u L'échec attend ce nier comme celui La protection de destruction des in contrôle des mal nous occupons ici

Pour contrôler tes il faut d'abor du trouble, chsc tre par l'expérien tion des spéciali répartissent en leur cause.

1. Maladies du turels;

2. Maladies du croches destructeu

3. Maladies du

AGENT

Ces agents qu maladies végétal mat, l'humidité fications qui s'y r aussi ces mala parce qu'elles se tions vitales de l dans un milieu c Elles se contrôlent qui les a produite

Plusieurs mala par des microbes bes fait généraler dans lesquelles i leur action prop Les maladies m siège à l'intérieu vons pas de cor arrêter et lorsqu'étant due à l'acti enlever les plant la propagation d doit se faire dès l symptômes et il temps

CHA

Le troisième pour cause le tains champigno la masse est sou forme de duve Ces champigno moyen de spores disséminées dan moyens. Pour l ter la germinati de ces dernières la désinfection l'application de qui ont le pouv les germes. Il y différente natu mais celui qui e la bouillie bord un très grand no

La bouillie b faite et bien ap risateurs et non l'appliquer en p de bons résultat