

Herba glauca sesquipedalis multiflorus. *Radix* fusiformis simplex caules plures brevissimos decumbentes alens. *Folia* radicalia confertissima ovata integerrima trinervia glaberrima supra olivaceo-viridia, subtus rubescenti-viridia, petiolis caules pedunculosque superantibus. *Caules* reliquis foliorum obiecti in pedunculos vel ramos corymbosos unifloros foliis paucis linearibus munitis divisi. *Calyx* gracilis cylindricus calyculatus pedunculo vel ramo suo longior; squamis exterioribus brevibus linearibus adpressis diversae altitudinis: interioribus aequalibus carinatis glaberrimis. *Flosculi* saturatè flavi calyce altiores lineares 5-dentati. *Semina* linearia supernè paulo attenuata pappo sessili simplice scabriusculo coronata.

Hab. On the Copper-Mine River.

292. *Saussuria multiflora*? *Decand. An. du Mus.* tom. xvi. p. 199? exclud. synonym. Lin. (B.)

293. *Sonchus sibiricus*: *Willd.* iii. p. 1522. (W.)

294. *Tanacetum pauciflorum*: foliis bi-pinnatis villosis sessilibus, caule simplici foliis longiore subunifloro, flosculis omnibus hermaphroditis. *MS. in Herb. Banks.* (S.)
Ulmariis. Folia bi-pinnata et triplinatifida, laciniis angustis obtusiusculis. Flos plerumque unicus terminalis interdum alter è suprema axilla.

295. *Artemisia virgata*: frutescens sericeo-incana, ramis erectis gracilibus, foliis capillaceis bi-pinnatifidis: floralibus simplicibus calyce hemispherico villosio longioribus. (W.)

Odor Art. Abrotani cui habitu similis sed foliis duplo minoribus.

296. *A. campestris*: *Willd.* iii. p. 1827. *Pursh.* ii. p. 521. (W.)

297. *A. borealis*: *Willd.* iii. p. 1839. *Pall. Itin.* iii. p. 755. t. H. h. f. 2.

A. spithamea? *Pursh.* ii. p. 522? (B.)

298. *A. vulgaris*: *Willd.* iii. p. 1845. *Pursh.* ii. p. 522. (B.)

299. *A. integrifolia*: *Willd.* iii. p. 1846. *Gmel. Sibir.* t. 48. f. 1. *Pursh.* ii. p. 521. (W.)

300. *Gnaphalium plantagineum*: *Pursh.* ii. p. 525. *G. plantaginæfolium* *Willd.* iii. p. 1882. (W.)

301. *G. dioicum*: *Willd.* iii. p. 1882. (W.)

302. *G. alpinum*: *Willd.* iii. p. 1883. *Pursh.* ii. p. 524. (B.)

303. *Erigeron pulchellum*: *Mich. Am.* ii. p. 224. *E. bellidifolium*: *Pursh.* ii. p. 532. *E. serpentaria*: *Herb. Banks. MSS.* (S.)

304. *E. purpureum*: *Willd.* iii. p. 1958. *Pursh.* ii. p. 533. (S.)

305. *E. philadelphicum*: *Willd.* iii. p. 1957. *Pursh.* ii. p. 533. (W.)

306. *E. glabellum*: *Nuttall. Am.* ii. p. 147. (W.)

307. *E. uniflorum*: *Willd.* iii. p. 1960. *Eng. Bot.* t. 2416. (A.)

308. *Senecio pauciflorus*: *Pursh.* ii. p. 529. (S.)

309. *S. gracilis*: *Pursh.* ii. p. 529. (W.)

310. *S. balsamitæ*: *Willd.* iii. p. 1998. *Pursh.* ii. p. 530. (W.)

311. *S. aureus*: *Willd.* iii. p. 1999. *Pursh.* ii. p. 530. (W.)

312. *S. lugens*: tomentosus, foliis integris glanduloso-dentatis: radicalibus sub-spatulatis: caulinis linearibus acutis, caule simplici, corymbo denso. (B.)