

Le lupus érythémateux (érythème centrifuge symétrique de Brocq ; séborrhé congestive de Hébra), débute par des rougeurs congestives, petites au début, devenant de plus en plus grandes. Le derme est légèrement infiltré et tuméfié de telle sorte que les plaques font une légère saillie. Cette plaque a une tendance marquée à l'extension centrifuge.

Siège : Sa localisation très spéciale est aux joues, en particulier aux pommettes, à la face dorsale du nez, aux oreilles. Le siège du lupus vulgaire est aussi aux joues et au nez, c'est-à-dire aux parties découvertes et non protégées de la face. Il vient aussi à l'oreille et peut envahir le conduit auditif, la membrane du tympan, l'oreille moyenne, et déterminer une otite très grave. Aux paupières il cause quelquefois des ectropions et peut envahir l'œil et les conduits lacrymaux.

Traitement : Lotions, compresses, pommades antiparasitaires, topiques, emplâtres, caustiques, tout a été essayé contre le lupus, mais on n'a pas tardé à se convaincre qu'en se servant de ces divers procédés, non seulement on n'atteignait pas le but, mais qu'on le dépassait en produisant des escharifications profondes d'où résultaient des cicatrices vicieuses et des difformités irrémédiables. Les procédés chirurgicaux sont les plus utiles, permettant de guérir la lésion sans défigurer le malade.

Méthode sanglante.	}	Ablation.
		Raclage.
		Scarifications.
Méthode non sanglante.	}	Electrolyse.
		Certains caustiques.

La méthode par les scarifications est plus longue que la méthode par l'électrolyse mais laisse moins de cicatrices.

Favus : C'est un ensemble de lésions cutanées produites par un champignon parasite de l'homme et des ani-