

Le fait que quatre autres enfants dans la même famille ont eu les symptômes de l'angine diphthéritique confirme le diagnostic de diphthérie chez le premier cas. Je n'avais pas fait d'injections préventives, mais tous dès l'apparition des premiers symptômes ont reçu 20 c. c. de sérum avec amélioration immédiate.

J'ai employé dans l'espace d'une année au delà de 260 bouteilles de sérum de 10 c. c. J'ai fait de larges injections chez les enfants atteints et des injections préventives à force. Six cas de mort pendant cette période chez des sujets qui ont subi le traitement trop tard ; à part deux qui se sont montrés des cas singuliers que je vous rapporterai plus tard.

M. le Dr Marois.

Je vous présente douze nouvelles observations de cocaïnisation.

Accouchements 2

Appendicite 1

Hernie irréductible, cure chirurgicale.

Tumeur vésicale et calculs, cystotomie sus-pelvienne.

Tuberculose tibi tarsienne

Epithélioma de la surface plantaire du pied. (*M. le Dr Ahern*)

Hémorroïdes, ablation au thermocautère.

Sciaticque 4

Dans les deux cas d'accouchements et les six opérations pratiquées sous l'influence de la cocaïne en injection sous archnoïdienne, l'anesthésie a été parfaite excepté dans le cas d'appendicite où l'analgésie a laissé à désirer cependant pas suffisamment pour obliger l'emploi d'autres anesthésiques.

La rachi cocaïnisation pour la cure de la sciaticque n'a pas donné les résultats que les cas rapportés dans la littérature médicale nous faisaient espérer.— Dans deux opérations, le résultat a été nul car après cinq à six heures, les douleurs ont recommencé. Dans une troisième observation la malade a éprouvé un soulagement réel et persistant, mais pas complet. Dans la quatrième observation que je vais vous communiquer, la guérison a été complète et immédiate.

Mme R....., 22 ans, frère mort de pleurésie à 35 ans, deux sœurs maternelles mortes de tuberculose. Au mois de Septembre 1900 la malade est atteinte pour la première fois d'une sciaticque droite, qui la retient deux mois au lit. Au mois de Janvier 1901 nouvelle attaque qui dure quinze jours ; la malade était incapable de marcher. Une troisième attaque plus sévère que les autres commence le 2 mars. Après avoir employé sans