

égard les résultats qu'on pouvait en espérer. D'ordinaire les lèvres de la plaie se réunissent régulièrement sans subir la dégénérescence cystoïde et la filtration des liquides en excès ne se fait guère mieux après qu'avant.

Pour rendre la cicatrice cystoïde et perméable, on pourrait, une fois la section de la sclérotique achevée, laisser quelques temps entre les lèvres de la plaie soit une anse de fil catgut, soit un lambeau conjonctival, comme on l'a déjà proposé. C'est aux chirurgiens à s'ingénier et à modifier la sclérotomie simple, de façon à ce qu'elle soit suivie de dégénérescence cystoïde permanente jouant le rôle d'une soupape de sûreté et ne permettant pas à la tension intra-oculaire de s'élever au dessus d'une certaine limite.

Paris 23 novembre 1897,

A Québec le 12 novembre 1899.

Clinique des maladies internes à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu

Par le Dr D. BROCHU.

Phthisic Pulmonaire et syphilis du poumon.

(Suite.)

3^{ème} OBSERVATION. Le malade que nous avons observé au lit 33 est âgé de 41 ans; il a exercé les métiers de menuisier et de peintre depuis plusieurs années. Comme antécédents personnels, il dit avoir fait un usage régulier et un peu abusif des boissons alcooliques pendant les sept à huit ans qui ont précédé sa maladie; durant la même période, il a été atteint d'une inflammation aiguë des poumons et il eut une attaque de colique saturnine suivie de la paralysie des extenseurs de la main et de l'avant-bras. Depuis ce temps, il a senti diminuer ses forces; il était porté à la toux et il éprouvait un essoufflement facile durant les exercices; enfin, il y a sept mois, des attaques d'hémoptysie, qui se sont répétées à différents intervalles, l'ont forcé à venir demander son admission dans nos salles.

Comme antécédents héréditaires, il rappelle que son père est mort de consommation à la suite de pleurésie, à l'âge de 42 ans, de même un frère et une sœur, l'un et l'autre vers l'âge de trente ans; de plus, un autre de ses frères souffre actuellement d'hémoptysie.