

l'extrémité, ses antennes sont un peu plus courtes que dans la ♀, du reste même coloration.

9. Limnérie sessile. *Limneria sessilis*, Prov. Nat. vii, p. 148, ♀.

♀—Long. .18 pouce. Noire ; les palpes avec les écailles alaires, blanchâtres. Ailes très légèrement enfumées, nervures d'un brun pâle, stigma jaune, aréole, assez grande, sessile pentagonale. Pattes rousses, les 4 cuisses postérieures noires ; hanches noires ; pattes postérieures noires, les jambes avec un large anneau pâle au milieu. Abdomen en massue fusiforme, noir avec un anneau roux au sommet de tous les segments excepté le premier ; tarière presque aussi longue que l'abdomen, forte, recourbée.—P.C.

Espèce bien caractérisée par son aréole sessile et la coloration de son abdomen.

10. Limnérie marginée. *Limneria marginata*, Prov. ; *Campoplex marg.* Prov. Nat. vi, p. 146, ♀.

♀—Long. .18 pouce. Noir ; les mandibules, les palpes, écailles alaires, un point en avant, les trochantins avec les 4 hanches antérieures, d'un jaune pâle. Antennes plus courtes que le corps, filiformes. Ailes hyalines, nervures et stigma jaunâtres, aréole sessile, triangulaire. Métathorax avec plusieurs lignes soulevées. Patte rousses, hanches postérieures avec leurs trochantins, noir, leurs jambes et leurs tarse plus ou moins foncées. Abdomen arqué, comprimé à l'extrémité, à premier segment grêle, allongé, noir, tous les segments à partir du 2^e marginés de jaune au bord postérieur. Tarière courte, ses valves noires.—R.

11. Limnérie enfumée. *Limneria infumata*, Prov. Nat. vi, p. 148, ♀.

♀—Long. .22 pouce. Noire ; mandibules, palpes, écailles alaires les trochantins, un anneau plus ou moins prononcé au milieu des jambes postérieures avec la base de leurs tarse, jaune-blanc. Antennes plus courtes que le corps ; bassin du méthathorax strié transversalement. Ailes légèrement enfumées, nervures et stigma, brun ; aréole petite, triangulaire, pétiolée. Pattes d'un roux clair, la base des jambes postérieures, leur extrémité de même que celle de leurs tarse, d'un noir plus ou moins foncé ; hanches noires, les trochantins aussi noirs quelquefois. Abdomen légèrement comprimé à l'extrémité, en massue postérieurement, le 1^{er} segment long, renflé à son extrémité, les segments roux postérieurement à partir du 3^e, cette couleur rousse plus étendue