

ver à soie d'Europe la seule nourriture qui lui convient. Figurez-vous un framboisier à tronc solide et droit de 15 à 20 pieds de hauteur, avec un diamètre de 4 à 5 pouces; du reste même forme et même apparence des feuilles, avec la même disposition sur les pousses que dans notre framboisier commun.

Quant aux insectes, nous fîmes force connaissances avec de nombreux individus que nous n'avions pu voir encore vivants. Ce furent entre autres: *Alaus oculatus*, *Passalus cornutus* et une blatte voisine de celle de nos maisons, que nous primes dans des souches pourries. Les feuilles sèches sous les arbres nous offrirent: *Euryomia fulgida*, *Lachnosteria fusca*, *ilicis*, *balia* et *tristis*, *Lucanus elaphus*, *Arhenodes septentrionalis*, *Trox porcatus* que nous primes par centaines dans un endroit où un boucher était venu déposer les balayures de sa boutique. Nous trouvâmes aussi le *Doriphora 10-lineata* par milliers, dans un champs de patates.

Comme nous avons remarqué que la ligne du chemin de fer traversait plusieurs marais sur les bords desquels la prairie se trouvait encore à l'état vierge, nous y fîmes aussi une visite pour y reconnaître les plantes qui s'y trouvent. Et d'abord nous purent prendre un superbe *Cotalpa lanigera* que nous vîmes briller sur une feuille de saule, c'était le premier que nous rencontrions. Nous ne fîmes pas peu surpris de trouver ici en pleine floraison, et avec non moins d'éclat qu'ils n'en exhibaient dans notre jardin, l'éphémérine, *Tradescantia virginica* et le lupin vivace, *Lupinus perennis*. Parmi les plantes qui n'étaient pas encore en fleurs, nous pûmes cependant identifier les suivantes: *Eryngium yuccifolium*, c'est une ombellifère qu'à ses feuilles glauques et épaisses on serait tenté de ranger parmi les Cactées, on la confondrait encore davantage avec l'*Yucca filamentosa*, dont elle présente toute l'apparence. *Silphium laciniatum* est une Composée de 4 à 5 pieds de hauteur, à feuilles très grandes et grossières et à suc tellement résineux, que les enfants se plaisent souvent à rompre sa tige, pour aller y cueillir quelques jours après une boule de gomme qu'on mâche comme on le fait de celle de notre épinette. Notons encore la *Cacalia tuberosa*, la *Valeriana edulis*, le *Lathyrus palustris*,