

5.—*AGROPYRUM REPENS*, Beauv.

(Chiendent ; Quack, Scutch ou Couch).

Bien connu dans tout le Canada comme mauvaise herbe dans les cultures, en raison de sa végétation vigoureuse et de ses rhizomes, qui en rendent l'éradication difficile. Quand il est vert, le bétail en est très friand, et si on le fauche quand il est en fleur, on en obtient un foin riche. Seulement, au bout de quelques années, il remplit le sol de rhizomes entrelacés et ne produit que peu, de sorte qu'on ne peut le considérer que comme une mauvaise herbe. D'après l'analyse il est évident que le fourrage a une valeur nutritive considérable.

*AGROPYRUM TENERUM*, Vasey

(Ray-grass de l'Ouest ; Western Rye Grass).

Indigène, vivace, croissant dans les terrains bas et sur les collines des prairies ; commun depuis le Manitoba jusqu'au Pacifique. Hauteur, 3 à 4 pieds. Floraison, 1<sup>er</sup> au 15 juillet. Cette graminée réussit remarquablement bien quand on la cultive, et est l'une des meilleures à faucher dans l'ouest ; elle produit un nombre considérable de feuilles ; la tige en est droite, mince. C'est une graminée hâtive

qui fait bien dans les terres fortes, même si elles sont légèrement imprégnées d'alcali. A juger d'après sa composition, elle n'est point inférieure aux autres espèces du même genre, elle est de bonne qualité et nutritive.

7.—*AGROSTIS VULGARIS*, With.(Franc-foin, *Agrostis* commune ; Red Top).—Fig. 1.

Graminée introduite, mais maintenant spontanée partout, vivace, convenant surtout aux terrains bas, où elle devrait avoir place dans les mélanges pour pâturages permanents. Elle forme un gazon ferme, et dans un bon sol produit une bonne récolte de foin fin, flexible. Floraison, 28 juin au 10 juillet. Hauteur, 2½ à 3 pieds. Sans aucun doute, fourrage de grande valeur, mais moins riche en albuminoïdes que d'autres mentionnés ici.



Fig. 1.—Franc-foin