

sent dans le cours des auto-intoxications, aphasie urémique par exemple. Chez un enfant de 9 ans atteint d'anasarque consécutif à la scarlatine, M. Dupré a vu une aphasie motrice complète avec aphasie incomplète et parésie du membre supérieur droit se produire après une anurie de vingt-quatre heures; les accidents durèrent deux jours et cédèrent après le rétablissement de la sécrétion urinaire. Une aphasie momentanée fut observée aussi chez un vieillard atteint d'atrophie rénale et présentant un accès d'urémie. L'aphasie urémique est passagère, intermittente, variable et bénigne.

M. BEUGÉ a insisté sur la nécessité de dissocier le centre classique de la parole. Ce dernier ne répond qu'à l'articulation des mots proprement dite. Or, la parole exige encore pour se produire un courant rythmé et méthodique produit par les organes respiratoires et la modulation de la voix par le larynx. Il y a donc un centre laryngé et un centre dirigeant le fonctionnement des organes respiratoires en tant que participant à la production de la voix. Du reste, il se produit cliniquement des aphasies dissociées dans lesquelles l'aphasique conserve, par exemple, l'intonation et le rythme de la parole tout en ne pouvant articuler les mots: d'autre part, comme dans l'aphasie hystérique, le trouble peut ne porter que sur l'intonation. Enfin, lorsque le malade n'a conservé que le rythme du mot, M. Beugé n'admet pas une lésion sous-corticale respectant le centre de Broca et empêchant l'extériorisation de l'usage motrice verbale, mais une lésion d'un centre spécial.—*Union médicale de Paris*.

Instruction concernant les soins à donner aux foudroyés et aux victimes des accidents électriques. — Ces accidents sont devenus si fréquents que le ministre des travaux publics a demandé à l'Académie une instruction essentiellement pratique pour tous ceux qui peuvent avoir à l'utiliser. La voici telle qu'elle a été rédigée par M. Gariel :

On transportera d'abord la victime dans un local aéré où on ne conservera qu'un petit nombre d'aides, trois ou quatre, toutes les autres personnes étant écartées.

On desserrera les vêtements et on s'efforcera, le plus rapidement possible, à rétablir la respiration et la circulation.

Pour rétablir la respiration, on peut avoir recours principalement aux deux moyens suivants : la traction rythmée de la langue, et la respiration artificielle.

1^o Méthode de la traction rythmée de la langue.

Ouvrir la bouche de la victime, et si les dents sont serrées, les écarter, en forçant avec les doigts ou avec un corps résistant quelconque, morceau de bois, manche de couteau, dos de cuiller ou de fourchette, extrémité d'une canne. .