

une salivation abondante. Le *mercure* fait aussi saliver en exerçant une action irritante spéciale sur le périoste alvéolaire et les gencives.

6° ANTI-SIALAGOGUES.—(Atropine, opium).

L'*atropine* et l'*opium* ont une action sédative prononcée sur le système nerveux ; ils diminuent toutes les sécrétions et assèchent les muqueuses.

L'estomac.

L'estomac est à la fois une organe de motilité et un organe de sécrétion ; suivant que les médicaments agissent sur l'un ou l'autre de ces éléments, on les divise en deux groupes distincts. Dans le premier groupe, modificateurs de la motilité, se rangent les *vomitifs*, qui font contracter violemment l'estomac, les *anti-vomitifs*, qui ralentissent les mouvements péristaltiques, et les *carminatifs*, qui calment l'irritation nerveuse et facilitent l'expulsion des gaz. Le second groupe, modificateurs de la sécrétion, est constitué par les *stomachiques*, qui activent les sécrétions et l'appétit, et par les *modificateurs proprement dits*, qui corrigent les sécrétions défectueuses.

1° **VOMITIFS.**—**Tartre émétique** (tartrate de potasse et d'antimoine, tartre stibié, kermès minéral, émétique).—**Ipéca.**—**Apomorphine.** (Zinc, cuivre, alun, moutarde, sel, eau chaude).

L'action irritante du *tartre émétique* et de l'*ipéca* se fait sentir en partie sur les parois de l'estomac et en partie sur les centres vomitifs de la moëlle. Le second est moins déprimant que le premier. L'*apomorphine* porte son action directement sur les centres nerveux, ce qui permet de l'administrer en injection hypodermique.

Les *sulfates de zinc*, de *cuivre* et d'*alun* sont des irritants directs de l'estomac, quand on les donne à hautes doses. Il en est de même de la *moutarde*, du *sel de table* et de l'*eau chaude*. L'attouchement de la luette constitue un vomitif mécanique.