

non rugueux. Ailes enfumées, le stigma brunnâtre. Pattes jaunes, les hanches, avec les cuisses excepté à l'extrémité et les tarses excepté le premier article, noir. Abdomen subpédiclé, en ovale, uni, les segments 2, 4 et 5 avec une fascie jaune de chaque côté, celles du 2^e obliques, celles du 5^e rapprochées au milieu; anus avec poils dorés assez abondants.—CC.

♂—De taille plus petite, avec les antennes légèrement denticulées en dessous, les taches du 5^e segment presque contiguës au milieu, le 6^e avec une ligne à la base.

Le manque de taches jaunes au 3^e segment abdominal de cette espèce, avec la tache oblique du 2^e, la distinguent particulièrement de toutes les autres.

5 Crabron trifascié. *Crabro trifasciatus*, Say, Say's Ent. i, p. 231.

♀—Long. 85 péc. Noir; des lignes orbitales avec le chareron, à duvet argenté. Une tache sur les mandibules, le scape des antennes excepté une grande tache noire en dedans, une strie sur le prothorax interrompue au milieu, les tubercules, le post-écusson, les pattes en partie avec des taches à l'ablomen, jaune. Mésothorax opaque, avec 2 lignes enfoncées sur le disque; métathorax avec la partie renfermée bien distincte, portant un sillon médian et des rugosités rayonnant légèrement de la base. Ailes subhyalines, les écailles avec le stigma, brun jaunâtre. Pattes noires, les jambes excepté une ligne en dedans avec l'extrémité des cuisses antérieures et les tarses excepté à l'extrémité, jaune. Les jambes postérieures portent aussi un petit anneau noir à leur extrémité. Abdomen court, large, ovale, subsessile, le premier segment fort atténué à la base, poli, uni, le 2^e avec une large strie jaune de chaque côté, une beaucoup plus petite et en pointe sur le 3^e, une autre sur le 4^e à peine interrompue au milieu, et une bande sur le 5^e; l'extrémité noire avec poils blanchâtres.—PC.

♂—Antennes avec une tache noire sur le scape en dessus, le pavillon avec le 5^e article denté en dessous; le post-écusson avec une ligne jaune interrompue. Abdomen avec les fascies du 2^e segment larges, celles du 3^e très petites, celles des 5^e et 6^e formant des lignes continues.

La forme de son abdomen avec la disposition de ses taches distinguent particulièrement cette espèce.

6. Crabron à-front-velu. *Crabro villosifrons*, Pack. Proc. Ent. Soc. Phil. vi, p. 84.