

OBSERVATION VI.—Ida, fille, 18 ans, primipare, vient nous consulter le 8 août 1895. Elle se croit enceinte de sept mois. Ses jambes sont œdématisées ; sa figure est bouffie. Elle se plaint de céphalalgie frontale depuis quelques jours. Sa vue est trouble. Le sommeil fait défaut depuis sept à huit jours. L'appétit manque. La miction est fréquente et peu abondante. Les selles sont quotidiennes.

Voici le tableau de l'analyse des urines :

8 août, 7 grammes d'albumine par litre.

15 " 3 " " " "

21 " $5\frac{1}{2}$ " " " "

26 " $2\frac{1}{4}$ " " " "

29 " $1\frac{1}{4}$ " " " "

Septembre 3, après l'accouchement, trace d'albumine

" 8 $1\frac{3}{4}$ grammes

" 14 $2\frac{1}{2}$ "

Ida a accouché le 3 septembre d'un enfant vivant à terme. Le travail a duré 10 heures, et Ida n'a pas eu d'éclampsie. L'albumine persiste en plus ou moins grande quantité quand elle laisse l'hospice trois mois après.

Voici le traitement que nous avons employé : régime lacté auquel nous avons ajouté la limonade de crème de tartre, et tous les deux ou trois jours une bonne dose de sulfate de magnésie et de séné.

Dans cette observation les reins étaient pourtant assez atteints par la maladie puisque l'albumine persistait encore trois mois après l'accouchement, mais la méthode évacuante employée avait empêché la pléthore ou la congestion vers les différents organes, et éliminé par l'intestin les matières toxiques.

OBSERVATION VII.—Célestine, 32 ans, fille, primipare, accoucha le 1er avril 1895. Présentation C. I. D. P. ; travail $3\frac{1}{2}$ heures.

Nous avons vu Célestine un mois avant. Elle avait beaucoup d'œdèmes aux pieds, aux jambes, aux mains et à la face. L'urine rare contenait quatorze grammes d'albumine au litre. Célestine a été soumise au régime lacté, à la limonade tartarique et aux purgatifs (sel et séné). L'albumine diminuait peu à peu pendant que la quantité d'urine augmentait. Célestine accoucha sans éclampsie et fit de bonnes relevailles, l'albumine disparaissant complètement quelques jours après l'accouchement.

OBSERVATION VIII.—Le 4 janvier 1895 nous voyons pour la première fois Madame L. D. C'est une femme d'une taille un peu élevée, d'une constitution forte, d'un embonpoint assez prononcé. Elle est enceinte de sept mois. Elle a déjà eu trois enfants à terme après des grossesses et des accouchements assez heureux. Il y a un an et demi elle a accouché prématurément à sept mois et demi d'un enfant mort, après avoir eu une attaque d'éclampsie constituée par plusieurs accès de convulsions. Lors de cette dernière grossesse elle a eu de l'œdème généralisé, des vertiges, des douleurs épigastriques. Elle ignore s'il y avait de l'albumine dans ses urines, son médecin ne les ayant jamais analysées.

Nous examinons minutieusement cette nouvelle patiente. Elle se plaint des mêmes symptômes de sa dernière grossesse, œdème assez considérable, vertiges, constipation, envie fréquente d'uriner, mais urine rare, maux de tête. La chaleur