

Voilà pour l'épithélioma du col à ses débuts ;—quant à la période d'état ou avancée, le diagnostic ne laisse pas de doute.

*Diagnostic du cas présent :* L'écoulement roussâtre et persistant fait songer au cancer, en lisant les détails donnés par la malade. Ce col un peu gros qu'on trouve au toucher inclinera à confirmer ce soupçon. Mais il manque la dureté : qu'ici cependant il ne faut pas attendre vu l'état gravide de l'utérus.

L'œil ne fournit rien de précis, les bords de l'ulcère, il est vrai, sont irréguliers, le fond présente des points jaunâtres. Mais on ne saurait mettre de côté l'ulcération tuberculeuse, bien que de ce côté les antécédents de la malade, de même que son état actuel général, soient excellents.

En somme, le microscope devra dire le dernier mot. En effet, le pathologiste rapporte, après examen des débris pris sur place, un épithélioma du col utérin.

*Anatomie Pathologique :* En deux mots. Nous trouvons trois variétés. L'épithélioma *Pavimenteux*, auquel se rattachent plutôt les formes superficielles, Ep. Papillaire et vaginal.

*Epithélioma Cylindrique*, qui à certaine époque de son évolution, a tant de ressemblance à la métrite glandulaire (1).

*Epithélioma Atypique ou Carcinome*, auquel se rattache plutôt le cancer nodulaire.

Mieux vaut ne pas entrer dans les détails histogéniques, puisque les plus récents travaux (2) ne montrent pas les maîtres de la pathologie en harmonie sur le sujet, et qu'on est réduit à reconnaître l'impossibilité actuelle d'une classification irréprochable basée sur l'histologie.

*Marche :* La douleur pourra longtemps être absente, pour ne se montrer qu'avec l'envahissement de la cavité utérine ou des tissus peri-utérins. L'écoulement deviendra franchement rosé, et peu à peu rouge, de même que la fétidité deviendra manifeste. Souvent il se développera un érythème cuisant des lèvres et de la partie supéro-interne des cuisses, sous l'irritation de l'écoulement.

Les symptômes digestifs ne tarderont pas à entrer en scène : anorexie, constipation, etc. ;—à son tour le système nerveux se montrera irritable.

L'infiltration néoplasique continuant son travail, tous les tissus environnants seront tour à tour ou simultanément envahis. La ca-

(1) Cornil. Loc cit. et Histol. de l'épithél. du col de l'utérus. Journ. des con- nais. méd., 1889, p. 44.

(2) Fabre-Domergue. Les cancers épithéliaux, 1898.