

l'extrémité de la corne, il faut la couper par le bout jusqu'au vif, afin que le sang en sorte.

Si le genou du bœuf boiteux enfle, il faut le lui frotter avec du vinaigre chaud, et y mettre de la graine de lin imbibée d'eau et de miel ou de vieux levain, de l'urine d'homme, ou autres semblables résolutifs.

CORNES CASSÉES.—S'il arrive qu'une bête à cornes se casse une corne, et qu'elle ne soit pas tombée tout-à-fait, il faut la faire sauter à l'endroit par où elle est cassée, pour avoir plus de facilité à en arrêter l'hémorragie, que l'on fait cesser avec une poignée d'orties grièches ou orties à fleurs blanches, pilées avec une demie-poignée de sel, et l'envelopper avec des étoupes. Il arrive aussi souvent que les cornes recourbées rentrent vers la tête et blessent l'animal, alors on les coupe par le bout avec un fer tranchant que l'on a fait rougir.

HÉMORRAGIES DU NEZ.—On arrête ces hémorragies au moyen d'une ou deux saignées, suivant la force de l'animal, et la quantité du sang qu'il a perdu. On le met ensuite dans l'eau jusqu'au ventre, un quart-d'heure en hiver, et une heure en été.

DE L'ARAIGNÉE OU ÉRAIGNIE.—Cette maladie survient aux bestiaux, pour avoir avalé, soit une araignée ou un autre insecte vénimeux, et encore pour avoir mangé de l'herbe imbibée de rosée. On la distingue ordinairement par une enflure générale qui paraît promptement, et qui est précédée d'une pesanteur de tête, d'une faiblesse qui les empêche de se tenir sur leurs pieds, et d'un tremblement universel ; il leur sort par les yeux, les naseaux et la bouche, une sérosité visqueuse et corrosive, presque toujours accompagnée d'une toux violente.

Remède.

taqués de
chaud, avec
sel, en de
heure après
pis de la v
de miel fo
aussi en de
Admini
gations fait
tiques. V
plaie avec
l'ail pilé.

SANGSUE
bête à corn
avale une
de l'animal
pour des
la sangsue
feuille de
la détache
mac, et qu
gouffe de s
de nourrit
une grande
saumure.

DE L'ÉRAIGNIE
un insecte
meuse, en
un tambour
Remède
ou quatre
promenez