

une à quatre en vingt-quatre heures, ou de la teinture de noix vomique dans du café, de 5 à 20 gouttes dans le même espace de temps, cette médication sera toujours surveillée avec soin et interrompue au moindre spasme.

L'éther en injections rend aussi de grands services.

Les paralysies diphthériques des muscles du larynx ou des membres seront combattues surtout par la faradisation ou par les courants continus, le pôle négatif étant placé sur la nuque et le pôle positif sur les régions malades. L'alimentation sera surveillée pour éviter des accès de suffocations, souvent fort graves.

Tous les jours on donnera aussi à l'enfant un bain salé suivi de frictions et de massage, et plus tard on joindra à ce traitement l'emploi de la noix vomique à dose faible.

**Convalescence.**—Elle sera l'objet de soins attentifs, car elle est souvent interrompue par les complications dues aux toxines diphthériques. Les lavages ou les pulvérisations dans la bouche seront continués ainsi que les pulvérisations dans l'appartement. Les aliments et les boissons seront toujours donnés en abondance. Tous les jours ou tous les deux jours l'enfant prendra un bain de 8 à 12 minutes de durée, et quelques bains antiseptiques de sublimé accompagnés de lavage au savon noir, quand il devra reprendre la vie commune.

La chambre où il aura séjourné durant sa maladie devra être désinfectée avec le plus grand soin par des lavages ou des pulvérisations avec une solution forte au sublimé ; à défaut de cette précaution on peut craindre la dissémination de la maladie, surtout quand cette chambre est habitée plus tard par d'autres enfants.

## FORMULAIRE

**Sirop contre l'épilepsie avec excitation maniaque.**—M. J. VOISIN

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Bromure de potassium.....            | 70 grammes.       |
| Nitrate de pilocarpine.....          | 0 gr. 035 miligr. |
| Sirop d'écorce d'oranges amères..... | 400 grammes.      |
| Eau.....                             | 600 —             |

P. S. A.—A prendre par cuillerées à bouche.

Chaque cuillerée à bouche de ce sirop contient environ un gramme de bromure de potassium et un demi-milligramme de nitrate de pilocarpine.