Pratique Médicale

Traitement de la lithiase biliaire

Par M. le Docteur Avierinos

Clinique. — Trois formes: I. Lithiase latente (symptômes de dyspepsie chronique; teint subictérique; douleurs sourdes; pesanteur dans l'hypochondre droit).

II. Colique hépatique (douleur extrême trois heures après le repas avec irradiation scapulaire droite et épigastrique; frissons; nausées; vomissements; puis ictère; puis endolorissement du foie; dyspepsie, calculs dans les selles parfois; retour de crises).

III. Colique vésiculaire: Le calcul tente de sortir de la vésicule, mais ne peut émigrer au dehors (petits accès douloureux, réitérés fréquemment; parfois état de mal persistant plusieurs semaines et coupé de phases d'accalmie; pas d'ictère; pas de calcul dans les selles).

Diagnostique. — Embarras gastrique; — gastralgie; — syndrome pylorique.

Étiologie. — Infection intestinale et biliaire; arthritisme? Ralentissement de la nutrition? Hérité, sédentaire, grossesse.

Traitement

I.—LITHIASE LATENTE

1.—Régime alimentaire. — Écarter de l'alimentation: vins de Bourgogne, alcool, beurre, graisse, huile, jaune d'œufs, tomate, oseille, fruits acides, cervelle, crudités. — Prendre surtout lait, laitages; viandes blanches ou rouges très cuites, légumes verts, poissons légers, jambon, pâtisseries sèches, vin blanc léger coupé d'eau d'Évian aux repas ou Vichy (Célestins).

2.—Régime hygiénique. — Marcher beaucoup; exercice continu; gymnastique rationnelle; chasse; vie en plein air; friction chaque matin avec ou sans tub; éviter massages violents; éviter les heurts; éviter les exercices par trop violents.

3.—Cure hydro-minérale. Vichy ou Carlsbad.

4.—Thérapeutique préventive. Prendre pendant dix ou quinze jours de suite, à chaque repas, un cachet de Salicylate de soude à 0 gr. 50 centigr. Benzoate de soude pour 1 cachet

II. — COLIQUE HEPATIQUE

A. — Calmer la douleur.

1. Au moment de la crise, faire une piquère de 1 c. c. de:

Chlorhydrate de morphine . . . 0 gr. 10 centigr.
Sulfate d'atrophine 0 gr. 005 milligr.
Eau de laurier-cerise 10 grammes.

Parfois une piquère d'eau distillée bouillie calme la douleur.

2. Appliquer au devant du foie des compresses trempées dans eau froide recouvertes de taffetas, ou dans eau chaude additionnée ou non d'alcool.

3. Inhalation de chloroforme. Lavement avec 4 grammes de chloral dans 60 grammes de lait.

4. Ou donner 4 à 6 capsules par jour de:

Éther 1 gramme par capsule.

5. Régime aqueux ou lacté.

B. — Tenter l'expulsion ou la dissolution du calcul.

1. Si le malade le supporte, donner le matin à jeun 300 grammes d'huile d'olive; commencer par un demi-verre à madère absorbé lentement, le sujet couché dans le décubitus latéral droit. Remplacer parfois par glycérine (1 à 3 cuillerées).

2. Donner dans la journée deux à quatre cachets de: Salicylate de soude . . . 1 gramme pour un cachet

3. Ou donner remède de Durande: 2 à 4 grammes par jour de:

Essence de térébenthine 10 grammes.

Éther ordinaire 20 grammes.

4. Ou donner V à XX gouttes par jour dans une infusion chaude de: Huile de Harlem (de Koning-Tilly).

C. — Dans l'intervalle des crises.

1. Donner régulièrement et méthodiquement, pendant une ou deux années consécutives pendant quinze jours par mois, à chaque repas, un cachet de:

Salicylate de soude à 0 gr. 50 centigr.

Benzoate de soude pour un cachet.

2. Régime alimentaire et hygiénique, comme 1 et 2 de I.

3. Cure hydrominérale indispensable une ou deux fois par an, à Vichy ou Carlsbad (parfois Pougues, Vittel, Capvern). Le traitement fait à Vichy constitue encore un des meilleurs moyens de venir rapidement à bout de la lithiase biliaire et des congestions qu'elle provoque sans cesse.

Faire au besoin la cure à la maison (Vichy, Grande-Grille chauffée au bain-marie).

Prendre progressivement, pendant vingt jours, un à trois verres: une heure et demie, une heure et demi-heure avant chacun des deux repas.

4. Prendre dix jours par mois de X à XX gouttes à chaque repas de:

Teinture de Boldo 16 grammes.