

culier et le printemps avant le hersage à la dose de 150
n ne laissant 250 lbs. à l'arpent. Malgré qu'en général, on
qu'elle peu sque plus en ne mettant pas assez d'engrais
u'en en mettant trop, il ne faut jamais exagérer
es doses des engrais potassiques et phosphatés ;
orélève un ar l'expérience a démontré que de moindres
e du sol. C oses, distribuées plus souvent ont, d'ordinaire,
dispensable eaucoup plus d'efficacité que les résidus des
production mêmes engrais accumulés dans le sol ; et, en
distribution, général, on les distribue à la terre partie à l'au-
es de bois o mme qui précède la plantation et partie au
destiné à printemps lors du premier hersage.

Il ne faut pas non plus négliger d'employer
a nourriture chaux dans les terrains qui n'en sont pas suf-
e considéra samment pourvus. Les feuilles et les tiges du
c, jusqu'à tabac en absorbent une quantité notable qui
gère la dos tre dans leur propre composition, et, il en faut
que la chl aussi dans le sol pour aider à l'élaboration plus
asse) qui, rapide des principes nutritifs nécessaires à la
ustibilité d plante.

Vu cette proportion considérable de cer-
a printemps ins principes, en particulier de la potasse que
nt de 5 à 1 tabac soutire du sol, certains praticiens sug-
es à la terre erent d'alterner les récoltes. C'est ainsi que
ts à l'arper omme plante sarclée, le tabac ouvre souvent
d'ordinaire rotation dans la culture alterne. Mais si l'on
la terre stitue abondamment les éléments de fertilité