

tion tous les cas doivent être traités comme s'ils étaient infectieux. Le traitement le plus efficace consiste en une propreté extrême de l'enfant et de ceux qui le soignent et dans des applications locales de nitrate d'argent au 1/50. Dans les hôpitaux d'enfants ces malades devraient être isolés.—*Concours médical.*

FORMULAIRE.

Diarrhée.—*E. R. Squibb.*

P.—Laudanum.....	2 drachmes.
Teinture de capsicum.....	2 “
Alcool camphré.....	2 “
Chloroforme pur.....	15 minimes.
Alcool, q.s.....	pour 10 drachmes.

M.—*Dose*: Vingt à quarante minimes.—*College and Clinical Record.*

Anurie.—*Eichorst.*

P.—Poudre de digitale.....	1½ grains.
Calomel.....	12 “
Sirop de gomme.....	q. s.

M.—Pour une pilule, à prendre trois fois par jour, mais tous les 4 jours seulement. Excellent dans l'anurie de la néphrite interstitielle.

Broncho-pneumonie des enfants.—*Sevestre.*

P.—Kermès minéral.....	¾ gr.
Benzoate de soude.....	de 7 à 15 grs.
Eau de laurier cerise.....	50 minimes
Julep gommeux.....	3 onces.

M.—*Dose*: Une cuillerée à café, de deux en deux heures, aux enfants atteints de broncho-pneumonie compliquant la rougeole.—*Union médicale de Paris.*

Coryza.

P.—Naphthaline finement pulvérisée.....	6 drachmes
Acide borique pulv.....	6 “
Camphre pulv.....	15 grs.
Extrait de violettes.....	15 “
Essence de roses.....	20 gttes.

M.—A priser.