de calomel, antikamnia et antifébrine. Le pouls est alors à 88 et la température 102°.

Les paquets sont continués toutes les 2 heures avec les résultats suivants:

11 hrs p.m., pouls 88, temps, 100 $\frac{3}{4}$ ° — 1 paquet.

18 décembre, 1 h a.m., pouls 88, température 100 — 1 paquet; 4 hrs a.m., pouls 100, température 103° — 1 paquet; 6 hrs a.m., pouls 100, température 103 — 1 paquet; 8 hrs a.m., pouls 94, température 103° — 1 paquet; on cesse ces paquets, parce que le médicament produit ses effets sur le cœur: il y a cyanose des lèvres et des extrémités.

9 hrs a.m., injection intra-utérine au permanganate de potasse au $\frac{1}{1500}$, 10 grs de quinine.

La quinine est continuée à la dose de 5 grains toutes les 4 hrs jusqu'au 19 décembre à 4 hrs p.m.

L'utérus fait bien son involution. Il se contracte fortement. Le col se referme petit à petit. La malade n'est qu'au 4^e jour des couches et déjà le fond de l'utérus est à mi-chemin entre le pubis et l'ombilic: ce qui n'arrive généralement que vers le 6^e ou le 7^e jours.

Le vagin est toujours de plus en plus malade. Il est couvert d'une couenne blanchâtre beaucoup plus apparente. Il est très sensible et très chaud au toucher. Les injections vaginales au permanganate de potasse sont cependant données régulièrement 4 fois par jour, et des tampons iodoformés y sont placés immédiatement après.

La malade tousse toujours et la bronchite ne s'améliore pas beaucoup.

Le 18 décembre, à 4 hrs p.m., le pouls est à 88, et la température à 101°. Injection intra-utérine.

19 décembre, 4 hrs a.m., température 103°, pouls 94; 8 hrs a.m., température 103°, pouls 112. Injection intra-utérine.

4 hrs p.m., température 105°, pouls 110. — La quinine a été administrée à dose de 5 grains toutes les 4 heures depuis hier matin. La malade prend beaucoup de lait depuis le commencement des couches.

5 hrs p.m., curettage avec la curette tranchante. J'extrait beaucoup de petits débris de l'utérus. L'involution rapide et la fermeture aussi prompte du col me faisaient croire pourtant que je n'en sortirais absolument rien.

Après le curettage, je badigeonne toute la surface utérine