

médicament restera, malgré cela, l'arme la plus puissante que nous ayons, *on peut l'affirmer dès aujourd'hui*, pour combattre la syphilis.

Traitement de la bronchite simple chez l'enfant, par le Dr Gillet,
dans *Gazette Médicale de Paris*. Septembre 1910.

Toute bronchite simple peut être le point de départ d'une broncho-pneumonie; cette complication est d'autant plus à craindre que l'enfant est plus jeune, qu'il s'agit par exemple d'un nourrisson, que cet enfant est plus débile, qu'il est soumis à l'allaitement artificiel, qu'il est hérédosyphilitique, rachitique, ou atteint de troubles digestifs anciens à marche chronique.

Si l'enfant tousse et s'il a de la fièvre, il faut le garder à la chambre, lui mettre des bottes d'ouate et vaporiser dans la pièce de l'eau additionnée d'un peu d'essence d'eucalyptus, de térébenthine, de teinture de benjoin, de goméol ou même simplement d'eau de Cologne. La température de la chambre sera maintenue à 18°.

Au début, il convient de faire une médication émolliente. Chez les *nourrissons*, on perscrira :

Sirup de capillaire.. . . .	20 grammes
Sirup de fleur d'oranger.. . . .	40 —

Mélez.

Toutes les 2 heures 1 à 2 cuillerées à café dans une infusion de mauve ou de quatre-fleurs.

On pourra donner avec autant d'avantage la potion :

Bicarbonat de soude.. . . .	1 gramme
Benzoate de soude.. . . .	1 —
Sirup de fleurs d'oranger.. . . .	15 à 10 —
Eau de tilleul.. . . .	15 à 40 —

1 à 2 cuillerées à café toutes les 2 heures.

Si l'enfant est au régime mixte, reprendre l'allaitement.

Une révulsion légère sera faite au moyen de petits cataplasmes sinapisés, laissés peu de temps en place et dont il faudra surveiller l'action sur la peau délicate des nourrissons. En cas de bronchite étendue, *bains chauds* donnés avec précaution.