rangs d'écailles hexagonlaes. Queue à 18 pennes, molles, élargie au sommet et arrondie. Doigts fortement pectinés sur les côtés. Ailerons du cou composés de plumes larges et molles. Une petite crête de plumes sur la tête.

La Gélinotte à fraise. Bonasa umbellus, Steph. Tetrao togatus, Linn.—Vulg. Perdrix de bois franc; Perdrix de montagne; Angl. Ruffed Grouse; Partridge; Pheasant.—Long. 18 pouces; ailes, 7.20; queue 7 pouces. Dessus gris, ou d'un brun rougeâtre; le dos avec taches cordées plus claires; dessous blanchâtre avec bandes transversales brunes. Queue terminée de gris avec une barre subterminale noire. Ailerons du cou noirs.

Séd. C.—Cette Perdrix se rencontre d'ordinaire dans les forêts de bois franc. De bien plus forte taille que le Tétras, et d'une saveur plus relevée, elle lui est aussi généralement préférée. La femelle pond de 12 à 18 œufs dans un nid qu'elle se construit sur le sol.

## 4. Gen. Lagopède. Lagopus, Vieillot.

Narines couvertes de plumes. Tarses emplumés jusq'aux doigts. Queue de 16 à 18 pennes. Couleur blanche en hiver.

Le Lagopède blanc. Lagopus albus, Aud. Tetrao albus, Gmel.—Vulg. Perdrix blanche; Angl. Willow Grouse; White Ptarmigan.—Long. 15.50 pouces; ailes 8; queue 5 pouces. Bec très fort, noir. En été d'un châtain roux ou orange sur la tête et le cou; les plumes du dos noires, barrées de brun jaunâtre. En hiver blanche; queue noire, mais point de noir autour des yeux.

H. R.—Ce Lagopède se montre parfois jusque dans le voisinage de Québec, dans nos hivers rigoureux

Le Lagopède des rochers. Lagopus rupestris, Leach. Tetrao rupestris, Gmel. Attagen rup. Reich. — Vulg. Perdrix blanche; Ang. Rock Ptarmigan.— Long. 14 50 pouces; ailes 7.50; queue 4.50 pouces. Bec grêle. En été, les plumes du dos noires, barrées de jaunâtre et terminées de blanc. En hiver, blanche, la queue noire; le mâle avec une bande noire de la base du bec à travers l'œil.

H. RR.—De plus petite taille que la précédente. Se montre communément en hiver dans les environs du lac St. Jean.