ress. Trans.

Une tache

mésothorax, ne ligne au-

es intermé-

des jambes excepté une

ues, noires,

l'égale lon-

igma pâle.

noires.-

tarses, noir. Les plaques basilaires avec une bande sur chaque segment abdominal et les valves de la tarière, noir.—Ottawa (Harrington).

Gen. EMPHYTUS, Leach, p. 191.

Aux 10 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes:

11. Emphyte pieds-jaun-paille Emphytus stramineipes, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 52.

Q—Long. .26 pee. Noir, grêle; le chaperon de labre, les mandibules excepté à l'extrémité, les palpes, le collier, les angles supérieurs du prothorax, la poitrine, les écaillettes, les nervures de la base des ailes, les pattes y compris les hanches, avec le ventre, jaune-pâle. Antennes pâles en dessous à l'extrémité, les articles 3 à 5 allongés, le 3e le plus long. Ailes hyalines, iridiscentes, les nervures et le stigma, brun; la cellule lancéolée avec une nervule transverse oblique; les ailes inférieures sans cellules médianes. Le bord apical des segments abdominaux plus ou moins pâle, leurs côtés aussi pâles.—Ontario (Harrington).

12. Emphyte de-Hull. Emphytus Hullensis, nov. sp.

—Long. .25 pce. Noir varié de jaune; la face au-dessous des antennes, excepté une petite tache enfoncée de chaque côté à la base du chaperon, les palpes, les joues, les orbites antérieurs et postérieurs, les bords supér eurs du prothorax, les écaillettes, les flancs avec les hanches et les trochanters, jaune-pâle. Les pattes jaune-roussâtre, tous les tarses avec les jambes postérieures lavés de brun; la poitrine noire. Antennes assez courtes, les 3 articles basilaires du pavillon allongés, le 1er des trois le plus long. Le chaperon échancré. Ailes hyalines, les nervures et le stigma, noir, le dernier pâle à la base; cellule lancéolée avec une nervure transverse oblique; ailes inférieures sans cellules discoïdales. Abdomen allongé, jaune-roussâtre avec une bande noire sur le dos interrompue à chaque segment.—Hull (Harrington).

 \mathcal{P} — Encore inconnue. Les 2 petites lignes enfoncées, transversales, noires, à la base du chaperon, rendent cette espèce bien reconnaissable.

fusciatus,

érieur du lanchâtre... 3 articles es angles roussâtre. bitale re- et la 2e cubitale

peu près térieures de leurs -oblong, es jaune-

Nort.

ires, les e blane de la écusson es, les e leurs