

ANALYSE

GLANURES

PETITS FAITS CLINIQUES

M. Rinton dans une leçon sur " l'importance de l'opération précoce des tumeurs douteuses du sein " est d'avis qu'on doit enlever de bonne heure toute tumeur du sein chez une femme qui a dépassé 50 ans. Si la femme se plaint de l'existence d'un petit noyau dur dans la glande mammaire, on doit l'enlever au plus tôt ; dans la majorité des cas il sera encore préférable pour les malades d'enlever en même temps toute la glande et les ganglions. Un simple Kyste sera disséqué et enlevé, puis examiné au microscope au point de vue de sa nature, mais s'il existe des Kystes multiples, toute la glande mammaire doit être enlevée. Rinton dans un certain nombre de cas qui rentrent dans la catégorie des tumeurs douteuses du sein, et dont l'examen fait après leur ablation démontra la nature cancéreuse. (*The Brit. med. j.*)

M. Fairchild étudiant le " traitement chirurgical de la péritonite tuberculeuse " conclut que la laparatomie doit être faite en vue du traitement lorsqu'on a diagnostiqué ou soupçonné un foyer de tuberculose intra-péritonéale. Si on a diagnostiqué une tuberculose chronique du péritoine avec ascite, l'opération abdominale est indiquée sitôt que le traitement médical et hygiénique s'est montré insuffisant. La même indication se présente dans la tuberculose fibreuse du péritoine et le traitement chirurgical a donné un certain nombre de guérisons lorsque la dégénérescence caséeuse n'est pas trop avancée. La laparatomie est inutile dans la péritonite tuberculeuse aigue avec ascite et température élevée. La laparatomie est encore inutile dans les cas de tuberculose adhésive du péritoine et il devient alors dangereux d'essayer de séparer les adhérences.

Chez nombre de phtisiques névropathes, dit Sabourin, (9 fois sur 10 des femmes) la tuberculose pulmonaire évolue pendant des années avec des alternatives d'amélioration et d'aggravation qui déroutent tous nos pronostics. Ces malades semblent jouer avec leurs bacilles comme le chat avec la souris. Cela peut durer fort longtemps et l'on est accoutumé de dire que, si ces malades là ne guérissent pas toujours, ils enterrent au besoin plusieurs médecins. C'est l'hystérie qui a l'influence prééminente sur ces tuberculoses à évolution déréglée.