

Les observations des vétérinaires concordent avec celles des chirurgiens et souvent chez les chevaux devenant tétaniques, à la suite de l'amputation de la queue, on voit cesser les accidents, si on ampute plus haut. En consultant les statistiques de la guerre de Sécession, vous verrez que la mortalité a été de 90 p. 100 pour le tétanos traité par les médicaments internes et de 65.5 p. 100 dans les cas de tétanos traités par l'amputation. Lorsque l'opération ne porte que sur les doigts et les orteils, la mortalité n'est que de 35 p. 100 et de 54 p. 100 si elle est pratiquée sur un segment de membre volumineux.

Curling et Yandell sont d'opinion que cette méthode donne 10 p. 100 plus de guérisons que tous les autres procédés. Cependant, Verneuil affirmait que non seulement l'amputation n'a pas d'action curative mais qu'elle ne possède même aucune action préventive. Certains expérimentateurs ont extirpé compétement le muscle dans lequel ils venaient d'injecter quelques gouttes de poison tétanique et n'ont jamais réussi à arrêter le tétanos. Quelques chirurgiens ont attiré l'attention sur le développement possible de colonies bacillaires à distance de la plaie, rendant ainsi inutiles toutes interventions opératoires prétendues radicales. Cette divergence d'opinion sur la valeur de l'amputation, pratiquée dès l'apparition des premiers symptômes tétaniques, tient surtout à ce que l'on n'a pas tenu assez compte : d'abord de la durée d'incubation et de l'époque de l'apparition de la complication ; puis de la marche et de la variété clinique du tétanos observé ; et en troisième lieu du degré d'intoxication tétanique et de la gravité du cas au moment de l'intervention.

Tous ces éléments de pronostic doivent guider la conduite du chirurgien, qui parfois est bien difficile.

Cependant vous serez toujours justifiable d'intervenir :

10. Lorsque des lésions graves, considérables atteignent les os, les articulations, les nerfs et décollent les muscles et la peau ;

20. Lorsqu'elles ne siègent que sur des segments peu importants des membres. Dans ces cas, l'importance du sacrifice à faire n'arrête pas l'opérateur. Ces indications opératoires sont à peu près admises par tous les chirurgiens ;

30. Enfin, dans les cas intermédiaires où l'étendue, la pro-