

Comté de Saguenay : — Retard général. Cependant le foin promet une excellente récolte et l'apparence du grain n'est pas moins bonne. Les pâturages sont bien garnis et l'herbe paraît très bonne.

Comté de Champlain : — Les chenilles et les vers gris ont fait quelques dégâts. La végétation de l'herbe des prairies et des pâturages a été bien lente ainsi que la levée des grains, mais maintenant, si le temps continue à être favorable, le rendement de nos récoltes devrait être excellent.

Comté de Montmorency : — Les pois, le blé-d'Inde et l'oignon ont été endommagés par les vers gris et les chenilles. La récolte de fruits s'annonce bonne, notamment pour les pommès. Les gelées ont détruit les herbes les plus tendres de nos prairies et pâturages cependant de récentes pluies suivies de belles journées ensoleillées activent beaucoup la végétation et nous donnent l'espoir d'obtenir une récolte supérieure.

Comté de Portneuf : — Printemps sec et très froid. Gelées tardives qui ont fait du tort aux jeunes plantes potagères. Les vers gris se sont aussi montrés très voraces en certains endroits. Pour le foin la récolte en sera moyenne, par suite des gelées de l'hiver, la longueur en sera moyenne, saison froide et sèche du printemps. Pour le grain, il n'a pas une très belle couleur en différents endroits, mais en somme la récolte sera au-dessus de la moyenne.

Comté de Québec : — Printemps trop froid et sécheresse prolongée. Tout est en retard. Les producteurs de lait ne cultivent pas assez de blé-d'Inde à ensilage, et par conséquent ne gardent pas assez de bétail pour pouvoir maintenir la fertilité de leur terre.

Comté de Berthier : — Tout est en retard à cause de la longueur de la saison froide. Nous avons eu suffisamment de pluie, mais il faisait si froid la nuit que tout a languit, et ce n'est que maintenant que la végétation redevient normale et encourageante. Le sarrasin n'est pas encore semé. Comme toujours les cultures sarclées ont été négligées par un trop grand nombre de cultivateurs. Prise dans son ensemble la récolte sera bonne. Cependant il y a un grand fléau à redouter, celui des sauterelles. Elles apparaissent déjà plus nombreuses que jamais.

Comté de Joliette : — Les blés et le tabac ont été ravagés par les vers gris. Les gelées ont diminué la quantité de foin de trèfle et l'herbe des pâturages. Les fleurs des arbres fruitiers ont également souffert du froid. Des légions de sauterelles sont déjà à l'œuvre, il faut se hâter de les combattre au moyen du son empoisonné. Les céréales semées de bonne heure relativement très avancées, si l'on tient compte des nuits froides que nous avons eues jusqu'aujourd'hui, et nous font espérer une récolte au-dessus de la moyenne. Pour cela il faut nécessairement que le beau temps continue à favoriser la végétation.

Comté de l'Assomption : — A l'exception des prairies, l'apparence de la récolte est généralement bonne. Le tabac est beaucoup mangé par les vers gris, mais les plantes potagères sont assez belles. Le grain est en retard à cause du froid, cependant il a encore le temps de croître pour donner une bonne récolte. Les gelées ont causés de sérieux dégâts aux légumes et aux jeunes herbes des pâturages, qui comme les

prairies avaient pourtant déjà assez souffert des verglas de l'hiver.

Comté de Maskinongé : — Les prairies et pâturages ont beaucoup souffert des gelées de l'hiver et du printemps. La récolte de fruits s'annonce assez bonne. Le temps se comporte assez bien depuis environ deux semaines, cependant les nuits sont encore froides. Il y a encore peu de sarrasin de semé. Avec les pluies que nous avons maintenant, la récolte du foin sera assez bonne et celle des grains pourrait être très bonne.

Comté de Montcalm : — Les dernières pluies que nous avons eues ont fait beaucoup de bien, mais le temps trop froid que nous avons encore la nuit retardent la végétation en général. Les fruits sont en abondance. Les vers gris ravagent les champs de tabac. Le rendement des prairies sera au-dessus de la moyenne, quoiqu'elles auraient donner davantage si le printemps n'avait pas été aussi froid et sec.

Comté de St-Maurice : — Les sauterelles et les vers gris sont les insectes les plus nuisibles aux récoltes. Ils sont combattus avec succès avec le son empoisonné. En général les récoltes ont une très belle apparence, quoi qu'elles soient retardées par des alternatives de froid, de pluie et de sécheresse.

Comté de Labelle : — Les pluies fréquentes que nous avons depuis le commencement du mois de juillet ont un effet magique sur le foin, le grain, les légumes et les pâturages. La récolte des fruits s'annonce pour être moyenne. Les sauterelles font des dégâts dans certains champs. Il s'est semé beaucoup de blé cette année et il est généralement beau, mais les vers commencent à lui faire du tort. Les gelées ont fait du tort au foin et même au grain, mais maintenant tout reprend de la vigueur et nous fait espérer une bonne récolte.

Comté d'Ottawa : — La récolte du foin ne sera pas très abondante, car les fortes gelées du mois de mai en ont retardé la croissance. Pour les autres cultures l'apparence est meilleure.

Comté de Pontiac : — Les gelées des mois de mai et juin ont retardé la croissance du foin et la levée du grain. Pour ce dernier, il aura le temps de se reprendre, car la température actuelle lui est bien favorable, mais pour le foin le rendement en sera à peine bon. Les sauterelles ont besoin d'être combattu de suite. Les légumes sont également trop en retard pour qu'ils donnent un bon rendement.

Comté de Témiscamingue : — Les gelées du printemps ont fait un tort considérable aux prairies, par conséquent leur rendement sera à peine moyen. Des gelées tardives ont aussi compromis la récolte de fruits et affecté les légumes. En général les cultivateurs sont cependant bien satisfaits, le grain est beau et les pâturages deviennent meilleurs depuis que le temps se réchauffe et que les pluies sont plus fréquentes.

Comté de Wright : — Les sauterelles commencent à manger le grain ici et là et les vers gris font leur large part de dégâts dans les jardins. Le rendement des vieilles prairies sera médiocre, tandis que sur les jeunes prairies la récolte sera médiocre. L'inclemence de la saison printanière ayant été suivie par une température tout à fait favorable à la végétation, les cultivateurs remercient Dieu, et escomptent à l'avance une récolte généralement bonne.

PETITES NOTES

Le mil doit être coupé aussitôt que la fleur est tombée. On fauchera le trèfle après l'ouverture des fleurs ; pour les prairies mixtes, la fenaison devra se faire entre ces deux époques.

Dans le fanage du trèfle, on le remuera avec de grands ménagements, car ce précieux fourrage, en séchant, perd facilement ses feuilles. C'est surtout dans cette opération du fanage du trèfle que le couvre-veillotte en coton rend de grands services, surtout lorsque le temps est pluvieux ; les meilleurs cultivateurs des États-Unis emploient d'une manière courante les couvre-veillottes en coton pour achever dans de bonnes conditions le fanage du trèfle et de la luzerne.

N'oublions pas qu'une vache laitière doit donner au moins 4,000 lbs de lait et 200 lbs de beurre, par an, pour payer les soins qu'on lui donne.

Ce qu'il y a de pis pour les vaches, à cette époque, ce sont les mouches et le soleil. Il faut les en préserver.

Veillez à ce que les vaches ne manquent pas d'herbe. Lavez les trayons des vaches, puis essuyez-les avant la traite ; égouttez bien vos vaches. Aérer et refroidir le lait au fur et à mesure de la traite. Le vaisseau dont vous vous servez pour le mettre et le transporter doivent être bien propres et ébouillantés chaque jour.

Il faut laver les moutons. C'est le temps de choisir dans le troupeau les béliers et les brebis que l'on conserve comme reproducteurs, et ceux qui devront être engraisés et vendus.

Continuons à sarcler et à biner nos cultures en lignes jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de passer entre les rangs avec la houe à cheval. N'oublions pas que si les sarclages sont devenus inutiles par suite de la destruction ou de l'absence de mauvaises herbes, les binages conservent toute leur utilité, puisqu'ils servent à ameublir, à aérer et à fertiliser la surface du sol.

Du bon entretien des prairies et des pâturages dépend, dans une grande mesure, la prospérité des exploitations agricoles. Plus on a d'herbe, plus on peut élever de bétail.

Aussitôt le foin enlevé de la prairie, on fera bien d'étendre sur le sol au moins 400 livres de phosphate basique Thomas, par arpent. Cette application, faite immédiatement après la première coupe, provoquera, dès cet été, la croissance d'un regain abondant et augmentera, l'an prochain, la production du foin.

Avec de l'ensilage conservé dans un bon silo, les vaches reçoivent en janvier une nourriture presque aussi succulente qu'en juin.

On devrait toujours couper le blé-d'Inde à ensilage d'une longueur variant d'un demi-pouce à un pouce. Le blé-d'Inde haché trop long est plus difficile à conserver.