

Désinfecter la dent du malade. — La cavité sera vidée de son contenu ; la dentine ramollie, enlevée. On débouchera les canaux qu'on lavera à l'eau oxygénée ou à l'eau chloroformée.

Une fois les phénomènes inflammatoires passés, on continuera les pansements antiseptiques de la dent et on procédera en temps voulu à son obturation.

Afin de hâter la résolution, on pourra badigeonner la gencive avec un des collutoires suivants :

Teinture d'iode.....	} 10 gr.
Teinture d'acodit	
Chloroforme	

ou :

Chlorate de potasse	} 2 gr.
Miel rosat	
Glycérine.....	

Fluxion phlegmoneuse. — L'extraction de la dent est alors urgente si l'on ne veut assister à la formation d'un phlegmon, accident grave nécessitant l'intervention du chirurgien.

L'antisepsie buccale devra être particulièrement surveillée. On ordonnera des lavages de la bouche avec :

Décoction de guimauve	200 gr.
Miel rosat.....	50 gr.
Liqueur de Van Swieten.....	30 gr.

Ou bien :

Acide phénique.....	1 gr.
Glycérine.....	12 gr.
Eau.....	250 gr.

Après l'extraction, on laissera saigner la plaie, puis la plaie sera soigneusement lavée à l'eau oxygénée à 12 volumes additionnée de trois fois son volume d'eau bouillie ou avec une solution d'aniodol :

Aniodol.....	10 gr.
Eau bouillie.....	500 gr.

Si l'existe un foyer, il faudra l'ouvrir, dans tous les cas, on devra toujours défendre absolument les cataplasmes sur la peau. L'application des cataplasmes ou des compresses antiseptiques sur la joue a pour action de favoriser la marche du pus au dehors, tandis que l'on doit tout faire pour amener l'abcès à s'ouvrir dans la bouche.