

Schiefblättrige Feige. W.

Habitat in insula Namoka, Tanna. h.

*59. *FICUS prinoides.*

F. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis basi angustatis, receptaculis globosis pedunculatis calyculatis, calycibus bipartitis. W.

Ficus prinoides. Humboldt et Bonpland.

Winterbeerblättrige Feige. W.

Habitat in America meridionali. h. (v. f.)

Rami teretes cinereo-fusci. Folia petiolata lanceolata quandoque oblonga bi- vel tripollicaria acuminata integerrima basi angustata, parallelo-venosa glabra. Receptacula globosa pisi minoris magnitudine pedunculata calyculata. Calyx bipartitus nec ut in plerisque tripartitus. W.

*60. *FICUS salicifolia.*

F. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis basi acutis, receptaculis globosis calyculatis geminatis pedunculatis. W.

F. foliis lanceolatis acuminatis, fructibus geminis axillaribus pedunculatis. *Vahl symb. 1. p. 82. t. 23.**

Ficus indica. Forsk. descr. 179.

Weidenblättrige Feige. W.

Habitat in Arabia felici. h.

†††† *Foliis indivisis angulatis ferratisque.*

*61. *FICUS repens.*

F. foliis cordatis ovatis acutis serratis basi inaequalibus, supra scabris subtus hirtis, caule repente, receptaculis clavatis pedunculatis calyculatis. W.

Ficus repens. Roxburgh.

Kriechende Feige. W.

Habitat in India orientali. h. (v. f.)

Rami subangulati. Folia ovata sesquipollicaria serrata, basi profunde inaequaliter cordata, apice acuta, supra scabra, subtus hirta. Receptacula longe pedunculata axillaria solitaria obovata basi valde attenuata calyculata, fabae magnitudine, scabra. W.