

Ailes et queue noires en dessus, les premières avec une tache blanche formée par la base de toutes les rémiges, excepté la première ; les secondaires et les tertiaires avec de semblables taches à la base et au bord interne ; toutes les plumes caudales, excepté celles du milieu, avec une tache blanche sur le bord interne, vers l'extrémité.

La femelle d'un vert olive en dessus et jaunâtre en dessous ; les côtés de la tête d'un olive sale ; les paupières avec une ligne au dessus des yeux, blanchâtres.

P. R. Cette Fauvette est assez commune en Mai ; elle niche d'ordinaire dans les sapins, pond 4 à 5 œufs rosés, pointillés de brun au gros bout.

2. La Fauvette Couronnée. *Dendroica coronata*, Gray. *Motacilla*, Lin. *Sylvia*, Wils.—Angl. *The yellow-rumped Warbler*.—Longueur $6\frac{2}{3}$ pouces ; ailes 3 ; queue $2\frac{1}{2}$ pouces. Dessus d'un bleu cendré avec stries noires ; dessous blanc, la partie supérieure de la poitrine et les côtés, noirs ; plumes, le plus souvent, lisérées de blanc ; la couronne, le croupion et les côtés de la poitrine, jaunes ; les joues et les lores, noirs ; deux bandes sur les ailes et une tache sur les trois plumes caudales extérieures, blanches.

La femelle à couleurs un peu plus brunes.

P. R. Cette Fauvette est un peu rare aux environs de Québec ; elle niche dans les broussailles, au bord des bois ; elle pond 3 à 4 œufs d'un blanc de crème, tachetés de brun et de rouge au gros bout.

3. La Fauvette de Blackburn. *Dendroica Blackburnia*, Baird. *Sylvia parus*, Wils.—Angl. *The Blackburnian Warbler* ; *Hemlock Warbler*.—Longueur $5\frac{1}{2}$ pouces ; ailes $2\frac{2}{3}$; queue $2\frac{1}{4}$ pouces. Dessus d'un noir presque uniforme, avec une large tache blanche sur les scapulaires ; une tache oblongue sur le milieu de la couronne, le côté de la tête, le cou, la gorge et la partie supérieure de la poitrine, d'un rouge orange brillant ; une strie noire de la commissure à l'œil, passant sur l'oreille, avec un croissant orange au-dessus de l'œil ; le dessous d'un jaunâtre orange avec stries noires sur les côtés. Les trois plumes caudales extérieures, blanches, avec la tige et l'extrémité noires ; les autres presque toutes noires.

La femelle à couleurs plus sombres ; avec les plumes des parties supérieures lisérées d'olive.

P. R. Cette Fauvette est rare à Québec ; elle niche dans