

Gray, indigène.—Vivace.—2 pds.—Blanc verdâtre, 1/2 pc., 2-6 fleurs; graines en tête cylindrique de 1 pc.—Graines, vent.—Prairies élevées; pâturages.—Défoncer, puis plantes sarclées.  
Bouton d'or; Tall Buttercup.—*Ranunculus acris*, L., Europe.—Vivace, 3 pds.—Jaune, 2/4 pc., solitaires.—Graines; dans le foin.—Prairies; foin et pâturages.—Défoncer, puis plantes sarclées.

#### FUMARIACÉES

Fumeterre dorée; Golden Fumitory.—*Corydalis aurea*, Wild., indigène.—2 ans, 6-12 pcs.—Jaune, 1-2 pc., grappe.—Graines.—Blés.—Jachérer, biner automne et printemps.

#### CRUCIÈRES

Cresson des marais, March Cress.—*Nasturtium palustre*, DC., indigène.—Vivace, 1-3 pds.—Jaune; grappe 1-3 pcs.—Graines, dans le foin.—Terrains bas; blés et foin.—Labourer automne et printemps.  
Arabette feuillée; Tower Mustard.—*Arabis perfoliata*, Lam., Europe.—2 ans, 2-4 pds.—Blanc jaunâtre; grappes grêles, allongées; cosses dressées, étroites, lisses, serrées contre la tige; feuilles radicales seules rudes.—Graines.—Champs de grain et de trèfle.—Labourer automne et printemps, arracher avant maturation des graines.  
Arabette hérissée; Hairly Tower Mustard.—*Arabis hirsuta*, Scop., Europe.—2 ans, 1-2 pds.—Blanc; très semblable à précédente, mais plus petite et tiges poilues.—Graines.—Champs de grain et jachères.—Labourer automne et printemps, arracher avant maturation des graines.  
Vélar d'Occident; Western Wallflower.—*Erysimum asperum*, DC., indigène.—2 ans, 6-12 pds.—Jaune, presque 1 pc.; grappe s'allongeant à mesure que cosses se forment; cosses anguleuses, 5 pcs, étalées.—Graines.—Jachères.—Labourer automne et printemps, arracher avant maturation des graines.  
Vélar à petites fleurs; Small-flowered Wallflower.—*Erysimum parviflorum*, Nutt., indigène.—2 ans ou vivace, 12-18 pcs.—Jaune 1-4 pc.; grappes allongées, diffère du précédent par fleurs petites, cosses courtes, 1-2 1/2 pcs, ascendantes et serrées contre la tige, couvertes et serrées contre la tige, couvertes de poils gris courts.—Graines.—Jachères.—Labourer automne et printemps, arracher avant maturation des graines.  
Vélar Fausse-giroflée; Wormseed Mustard.—*Erysimum cheiranthoides*,