

bien d'azur, la chair molle et des ailes aux épaules." M. Delpench nous montre ensuite le professeur Landouzy, affirmant depuis tant d'années la prédisposition du roux à la tuberculose et faisant des candidats à la phthisie le portrait suivant : peau blanche, fine, transparente, marbrée de veinules, souvent tachetée de macules, système pileux soyeux, de coloration rousse et rouge : iris bleu ; chairs molles, sueurs faciles parfois odorantes : formes plutôt grâces et élégantes." On dirait, ajoute M. Delpench, la traduction même du texte ancien, à peine différent de quelques détails peu importants. Et pourtant cela ne saurait être, puisque aucun des interprètes latins ou français n'avait encore donné leur sens légitimes aux courtes lignes que nous venons de commenter. Il s'agit donc là d'une simple rencontre ; de l'œuvre fortuite de deux observations indépendantes, séparées l'une de l'autre par un espace de plus de deux mille ans. Raison puissante de croire à leur justesse : " La vérité seule peut réveiller d'aussi lointains échos."

Emploi thérapeutique du sérum de lait.— Le sérum étudié par MM. Gimbert et Lereboullet s'obtient de la façon suivante : on traite une vache, on coagule le lait et on obtient le petit lait qui est filtré ; le coagulum est desséché à l'étuve, pulvérisé puis mélangé à du carbonate de chaux et on le laisse mariner deux ou trois heures avec le sérum de lait, on le filtre, on le stérilise à l'autoclave et on l'aditionne d'un peu d'acide phénique pour la conservation ; le sérum est inoffensif et indolore. Dans beaucoup d'affections accompagnées d'anémie et de débilité ce sérum donne des résultats plus remarquables que les autres sérums artificiels.

Suivant le rapport officiel, les mariages à Londres pendant l'année 1898, ont été de 41,223, soit 18.5 par 1000 habitants. C'est la plus forte proportion depuis 1878.

FORMULAIRE DOSIMÉTRIQUE

Pneumonie à forme typhoïde

Arséniate de strychnine.....	½ millig.
Aconitine.....	½ "
Digitaline.....	½ "
Salicylate de quinine	1 cent.

S.—Un granule toutes les ½ heures jusqu'à abaissement de la température, puis un granule toutes les heures.

Diarrhée cholériforme

Arséniate de strychnine.....	½ millig.
Hyoscyamine.....	½ "
Bromhydr. de morphine.....	1 "
Aconitine.....	½ "
Digitaline	½ "

S.—Un granule tous les ½ d'heure ou toutes les ½ heures.

Abcès osseux

Iodoforme.....	1 millig.
Phosphate de fer.....	1 cent.
Quassine.....	1 millig.

S.—Trois à six granules par jour, selon l'âge.

Angine diphthérique

Emétine	½ millig.
Chlorhydrate de pilocarpine.....	1 "
Sel de Gregory.....	1 "

S.—Un granule toutes les ½ heures jusqu'à diaphorèse et état nauséux, puis toutes les deux heures seulement.

SCÈNES DE LA VIE MÉDICALE

Ma première application de forceps

Par le Dr Gache

J'avais déjà fait une dizaine d'accouchements ; tout s'était passé à merveille, sans grand mérite de ma part d'ailleurs, car, suivant l'expression de mon vénéré maître Pajot, ils s'étaient faits devant moi. Cette