

(Pour le Journal d'Agriculture.)

LISTE

De quelques plantes et arbres d'ornement tirés, dans le principe, de l'Amérique Septentrionale.

DU CANADA.—Le Dirca des marais, bois-cuir, les frênes du Canada à feuilles de noyer, à feuilles sumac, de sureau, de lentisque, à petites feuilles, à feuilles rondes, et fruits larges; la monarde fistuleuse (1); le lis du Canada; la verge d'or du Canada; le rudbeckia lacinié (2); le chèvre-feuille de Goldie; le dierville jaune; le sureau du Canada; le cornouiller du Can.; le menisperme du Canada; la sanguinaire du Canada; la fumeterre fongueuse; la fumeterre du Canada; le mille-pertuis en pyramide; le clavalier à feuilles de frêne, frêne épineux; la spirée à feuilles de mille-pertuis; la sarracénie à fleurs pourpres; le cérisier nain ou du Canada; l'alisier à épi, amélanchier du Canada; le févier d'Amérique; le bonduc ou chicot du Canada; le sainfoin du Canada; le célastre grim pant (bourreau des arbres); le peuplier à grandes dents; le peuplier du Canada; le peuplier liard, grand baumier; le chêne rouge; le thuya occidental ou du Canada; le sapin du Canada, hemlock-spruce des Anglais; le sapin blanc du Canada, sapinette blanche.

DE LA CAROLINE.—L'amorpha fruticueux; le balisier flasque du Sud; le chêne écarlate; le chêne à feuilles en lyre; le cyripède pubescent (3); le tupélo à feuilles anguleuses; le laurier de Caroline; le laurier sassafras; l'éphémère à fleurs roses; le callicarpe d'Amérique; l'ipomée écarlate, jasmin rouge de l'Inde; le cantua piqué; la bignone catalpa; le frêne de la Caroline; la liatrie en épis; l'haléxia à quatre feuilles; le leiophylle à feuilles de thym; l'itéa à grappe; le chèvre-feuille dioïque; le chèvre-feuille de Fraser; la symphorine à petites fleurs; Para-

lio épineuse, ou angélique épineuse; la clématite violette; la zanthorhize à feuilles de persil; le magnolier à grandes feuilles; le magnolier à feuilles en cœur; le magnolier à grandes fleurs; le magnolier auriculé (1); le pavier rouge ou à fleurs rouges; le pavier jaune; la baptisie; le gordon à feuilles glabres (2); la kotmie coccinée; le décumaire sarmenteux; le syringa à grandes fleurs; la sarracénie rouge; le calycant; le houx commun; le févier monosperme; lupinus villosus; la glycyne odorante; le robinier visqueux; le robinier rose; le sumac glabre, vinaignier; la ptéléa à trois feuilles, orme de Samarie, orme à trois feuilles; le houx à feuilles de laurier; la fothergille à feuilles d'aune; le planère à feuilles d'orme; le peuplier baumier, tucamahaca; le galécirier, arbre à cire; le pin à l'encens.

DE LA VIRGINIE.—L'amaryllis de Virginie; la bermudienne à petites fleurs; la pontederice à feuilles en cœur; le phytolacca commun, raisin d'Amérique; la gyrosselle; le dracocéphale de Virginie; la bignone de Virginie; la bignone à vrilles; l'apocyn gobe-mouche; la boltonie à feuilles d'astères; l'yuca filamenteux; l'ascélépiade incarnate; le plaqueminière de Virginie; l'itéa de Virginie; la cacalie odorante; le chionanthe, jasmin; la lobélie cardinale; la conyze de Virginie; le rudbeckia pourpre; le mitchella rampant; le chèvre-feuille de Virginie; le tulipier; l'assiminier; le menisperme; le stewartia à un style; la napiée lisse; la silène; l'hydrangée; le fusain toujours vert; l'énothère à grandes fleurs; le gaura bisannuel; le cérisier, rosacée; le néflier ergot-de-coq; la glycyne tubéreuse; le robinier faux acacia, blanc; le polygala; le sumac amaranté; le noyer blanc ou skori, térébinthacée; le staphilier à feuilles ailées; l'hamamélis de Virginie; le micocoulier de Virginie; le peuplier de Virginie; le bouleau mérisier, odorant; le charme de Virginie; le chêne écarlate; la platane d'occident; le genévrier cèdre de Virginie, cèdre rouge.—A continuer. A.

(1) Fistuleux, cylindrique et creux comme une flûte.

(2) Lacinié, qui a des découpures un peu fines, comme la feuille de la vigne cionta.

(3) Pubescent, couvert d'un léger duvet.

(1) Auriculée, feuille qui a à sa base deux lobes séparés du disque.

(2) Glabre, feuille lisse, unie et sans poil.