

soit une pulvérisation de vaseline liquide mentholée à $\frac{1}{16}$ à l'aide d'un vaporisateur à l'huile.

Larmoyez conseil de pulvériser un quart d'heure ayant l'irrigation la solution suivante :

Glycerine pure.....	70 grammes
Eau distillée.....	30 —
Biborate de soude.....	20 —

Et de vaporiser dans l'intervalle des lavages de la vaseline liquide sur toute l'étendue de la pituitaire, afin de prévenir la formation des croûtes par l'application sur la muqueuse d'un enduit protecteur.

Vaseline liquide.....	30 grammes
Salol.....	1 —
Essence de geranium	5 gouttes

R. BOULET.

THERAPEUTIQUE

La méthode de Woodbrige dans le traitement de la fièvre typhoïde. Scalpe-13 octobre 1906.

Le Dr Corin, de Liège, a fait une étude de cette méthode qui a une grande vogue aux Etat-Unis.

Woodbrige, considérant que le typhus abdominal est dû à un germe spécifique dont l'habitat initial est le tractus intestinal, s'est dit que si l'on pouvait de bonne heure saturer ce canal de médicaments nuisibles à ces germes et inoffensifs ou même, utiles pour le malade, on aurait résolu la question du typhus.

Voici les médicaments qu'il emploie. Leur dosage un peu étrange tient à la différence des mesures et poids usités chez les Américains :

A. Pilules contenant :

Podophylline milligr. 0, 5.
Calomel, milligr. 3.
Carbonate de gaiacol, milligr. 3.
Menthol, milligr. 3.
Podophylline, milligr. 0, 5.

B. Pilules contenant :

Calomel, milligr. 3.
Carbonate de gaiacol, milligr. 14.
Menthol, milligr. 3.
Thymol, milligr. 3.
Eucalyptol, q, s.

C. Capsules contenant :

Carbonate de gaiacol, centigr. 16.
Thymol, centigr. 5-
Menthol, milligr. 25.
Eucalyptol, 5 gouttes.

Les pilules A sont données de 1/4 h. en 1/4 h., pendant les 24 premières heures de traitement et continuées le 2e et même le 3e jour si nécessaire jusqu'à obtention de 5 à 6 selles par jour.

Les pilules B sont alors administrées toutes les heures ou toutes les 2 hrs. Les intervalles sont allongés jusqu'à réduction des selles à deux. Le 4e ou le 5e jour, on donne les Capsules C, une de 3 h. en 3 h. jusqu'à la convalescence.

Woodbrige a remarqué que le premier effet est la chute de la température.

Le malade n'absorbe pendant le traitement rien d'autre que de l'eau pure bouillie.