

mois, et l'usage permanent de deux petites chambres, pour bibliothèque, spécimens paléontologiques etc. Il y a je crois un certain nombre de sociétés, qui seraient heureuses de se joindre à nous et s'assurer ainsi un local convenable pour elles-mêmes, et il serait facile d'arranger les choses pour qu'il n'y eût pas de conflit, les soirs que la salle serait occupée.

Un tel arrangement peut rarement être effectué au dernier moment, les locataires en profiteraient, et il surviendrait des difficultés, mais en s'y prenant à l'avance, pareille chose ne peut arriver. Je voudrais en conséquence suggérer qu'un comité de membres actifs, et je dois ajouter de membres enthousiastes, soit institué, pour prendre l'affaire en considération.

Pour ce qui est de notre reportage, rien ne saurait mieux fonctionner que le système, actuellement en vigueur. Cependant il est permis de songer à avoir un sténographe parfaitement entraîné. Trop vieux pour entreprendre un tel travail, ne pourrais-je pas, avec tout l'enthousiasme d'un "Gower" donner aux plus jeunes de nos membres le conseil d'apprendre la sténographie et leur dire combien il serait désirable et avantageux qu'un des membres de notre société pût se charger de cette tâche.

DOULEURS MUSCULAIRES

La Cimifuga est, assure-t-on, un spécifique contre les douleurs musculaires, rhumatismales ou autres. S'il y a fièvre on doit la combiner à l'aconit.

— *Med-Summary.*

LES BADIGEONNAGES DE COCAINE DANS LA SÉCRÉTION LACTÉE

Ce moyen facile et efficace, employé avec succès par le docteur Jolie, pour combattre la sécrétion lactée, consiste à badigeonner 5 à 6 fois par jour, les deux mamelons avec une solution à 5 o/o de chlorhydrate de cocaïne, dans un liquide composé d'eau et de glycérine à parties égales. Ces applications ont supprimé la sécrétion lactée au bout de 5 à 6 jours, et n'ont pas présenté, vu le peu d'étendue de la surface touchée, aucun inconvénient. La cocaïne agit probablement en empêchant l'érection du mamelon et, partant, en supprimant une des causes principales d'où dépend l'activité de la glande.

— *Gazette Médicale Belge.*