

Le Rendez-vous des Eleveurs

Nouveau record de production laitière

Beau succès remporté par le directeur des fermes expérimentales à Sainte-Anne de la Pocatière

La vache Ayrshire "Briery Lass"—85707—, possédée et élevée par le directeur des fermes expérimentales à Sainte-Anne de la Pocatière, vient d'établir un record de production laitière de 365 jours conformément aux règles du Canadian Record of Performance. Le record établi par cette vache Ayrshire bat tous les autres records canadiens ou mondiaux pour la production du gras.

"Briery Lass" a donné, en 365 jours, 22,035 livres de lait et 979 livres de gras, soit une proportion moyenne de 4.44 p. c.

Le record précédent pour le monde entier était détenu par une vache des Etats-Unis, "Lily of Willowmoore", avec 22,596 livres de lait et 955.56 livres de gras. Quant au record canadien, il était détenu par "Nellie Osborne of Elmshade", propriété de W.-C. Howick, P. Q., avec 22,506 livres de lait et 901 livres de gras. Comme on le voit, le record établi à Sainte-Anne de la Pocatière dépasse considérablement ces deux derniers.

Durant ses 365 jours d'essai, Briery Lass a produit en une seule journée 110 livres de lait, et 3040 livres de lait, à 4.2 p. c. en un seul mois, ce qui constitue également un record pour la production d'un jour et celle d'un mois.

Au cours des six mois derniers, un record mondial et deux records canadiens pour vaches Ayrshire ont été établis à la station expérimentale de Sainte-Anne de la Pocatière. Le record de Briery Lass est compris dans ce dénombrement.

Les petits cochons

A partir du moment où la truie a mis bas jusqu'au sevrage des nouveaux-nés, on doit apporter une attention toute particulière à la mère et aux petits. Les succès dépendent des soins donnés durant cette période.

Immédiatement après avoir mis bas, la truie ne doit pas manger une ration très forte et l'on doit l'accoutumer petit à petit à prendre une nourriture plus abondante. C'est moins le temps que jamais de soigner une truie à la diable, car l'expérience enseigne que c'est durant cette période que les petits cochons peuvent profiter le plus et de la façon la plus économique.

L'emploi des sous-produits de la farine est très recommandable; on peut y ajouter du lait écrémé. Une des meilleures nourritures que l'on puisse donner après une quinzaine de jours, ce sont des racines.

Les betteraves facilitent la lactation. Il n'est pas nécessaire de les trancher.

Durant trois semaines, les jeunes cochons ne prennent que le lait de la mère. Ensuite, ils commencent à manger, ou du moins ils essaient. Il n'y a pas grand inconvénient à les laisser manger avec

leur mère et ça simplifie le travail et l'installation.

Cependant, il est préférable de donner une nourriture spéciale aux petits. Alors, il faut faire une division de l'auge. L'ouverture de la section réservée aux petits doit être juste assez ouverte pour qu'ils puissent y prendre leur nourriture afin que la truie ne puisse y avoir accès. On peut donner aux petits cochons un mélange de lait écrémée avec de la fleur d'avoine, du grain trempé ou des racines, etc...

Quelques conseils

Les vaches laitières — En avril, il faut redoubler d'attention et avoir soin de les protéger contre les refroidissements.

Les jeunes veaux aiment le lait chaud et il est recommandable de leur en donner, au moins pendant la première semaine.

Vos moutons gagneront du poids et la laine ainsi que la chair auront une plus grande valeur si vous avez pratiqué la castration et l'amputation de la queue.

L'eau est essentielle à la santé d'un troupeau d'animaux, mais elle doit être propre et claire. Veuillez à ce que vos abreuvoirs soient d'une propreté impeccable et renouvez l'eau souvent.

La qualité des troupeaux de moutons de la province de Québec s'améliore constamment: d'après les renseignements qui ont été fournis récemment par le Dr A.-T. Charron, sous-ministre-adjoint de l'Agriculture, à Ottawa, 61% des troupeaux ont à leur tête des bétails de race pure.

Les cultivateurs qui ne gardent que des vaches communes subissent une perte chaque année.

Une bonne vache doit donner au moins 6000 livres de lait par année.

LE NOUVEAU SILO A DOUVES "CHAMPION"

Tout fabriqué en Cèdre Rouge et fortement recommandé par les autorités du Ministère de l'Agriculture.

Sa construction est absolument forte et son nouveau toit à coupe est particulièrement très précieuse.

Vous bénéficierez d'un prix spécial en transigeant directement par correspondance et vous ne devriez pas manquer de demander dès aujourd'hui, ma circulaire descriptive et illustrée.

Agents demandés où je ne suis pas représenté

EUG. GALARNEAU
PONT-ROUGE — QUE.



AVIS PUBLIC

Cité de Québec, - Bureau d'Hygiène.

Le Bureau d'Hygiène de la Cité de Québec donne avis à tous les cultivateurs et à tous les fournisseurs de lait et de crème, que le règlement concernant la consommation et la vente du lait et de la crème dans la cité de Québec n'a pas été amendé ni abrogé. Malgré les prétentions de certaines laiteries de Québec, ledit règlement est toujours le même et tout lait et crème qui entrent dans la Cité de Québec doivent provenir de vaches laitières qui ont subi ANNUELLEMENT l'épreuve à la tuberculine faite sous le contrôle et par le Vétérinaire de la Cité.

Le BUREAU D'HYGIÈNE de la Cité est décidé de faire observer le règlement dans toute son intégralité et les délinquants seront punis suivant la loi par la confiscation de leur marchandise ou l'amende.

Le Bureau d'Hygiène de la Cité de Québec,
par Jos. GOSELIN, M.D., D.H.P.
Directeur du Service.

LE BILAN DU C. N. R.

Le bilan du Chemin de fer national du Canada pour février et les deux premiers mois de 1926 indique que l'amélioration des affaires du réseau, déjà sensible en 1925, se continue cette année.

En février 1926 les recettes brutes du réseau national se sont élevées à \$17,693,338, une augmentation de \$1,207,296 ou de 7.32 pour cent sur le mois de février 1925. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de \$510,619 ou de 3.22 pour cent. Les recettes nettes se sont élevées à \$1,308,401, une augmentation de \$696,677 ou de 113.89 pour cent sur le mois de 1925 correspondant.

La période des deux premiers mois de l'année accuse aussi une augmentation substantielle. En janvier et février 1926 les recettes brutes se sont élevées à \$35,749,259, une augmentation de \$2,546,749 ou de 7.67 pour cent; les dépenses d'exploitation à \$32,803,217, une augmentation de \$485,233 ou de 1.50 pour cent et les recettes nettes à \$2,946,042 une augmentation de \$2,061,516 ou de 233.06 pour cent.

Le quotient d'exploitation pour les deux premiers mois de l'année fut de 91.76 comparé à 97.34 pour cent sur la période de 1925 correspondante, soit une diminution de 5.73 pour cent.

Voici un tableau résumé des recettes brutes, des dépenses d'exploitation et des recettes nettes:

Février	1926	1925	Augmentation
Recettes brutes	\$ 17,693,338	\$ 16,486,042	\$ 1,207,296
Dépenses d'exploitation	16,384,937	15,874,318	510,619
Recettes nettes	1,308,401	611,724	696,677
Deux mois			
Recettes brutes	\$ 35,749,259	\$ 33,202,510	\$ 2,546,749
Dépenses d'exploitation	32,803,217	32,317,984	485,233
Recettes nettes	2,946,042	884,526	2,061,516

**EPARGNEZ UN TEMPS PRÉCIEUX
A L'ÉPOQUE DE LA FENAISON**

Un gain d'une demi-journée de travail lorsque le mauvais temps menace la récolte, représente une économie de plusieurs tonnes de bon foin. Et cela ne prend pas beaucoup d'argent pour payer un outillage à décharger le foin de Louden. Deux hommes et un garçon, avec cet outillage, peuvent faire l'ouvrage de dix. Les outils à foin de Louden sont simples, d'un mécanisme aucunement compliqué ce qui évite les délays toujours coûteux. Écrivez-nous pour avoir notre catalogue complet et illustré.

THE LOUDEN MACHINERY CO. OF CANADA, Ltd.
55 Crimea Street - Guelph, Ontario

LOUDEN HAY TOOLS

"OMAZON"

Poudre tonique, nutritive, médicinale, dont l'action sur l'estomac, le foie et les intestins favorise la croissance le développement normal et assure la santé des animaux de la ferme. Incomparable dans les cas de Coliques, Vers, Constipation, Rhume, Diabète, etc.

POUR TOUS LES ANIMAUX DE LA FERME
LE GRAND REGULATEUR DE LA SANTE

POUR LES CHEVAUX — Cette poudre est un tonique sans rival, elle donne force et endurance.

POUR LES VACHES — Elle stimule l'appétit, aide la digestion et l'assimilation de la nourriture, d'où plus de lait et de beurre.

POUR LES POULES — Ajouter une petite quantité de cette poudre à la nourriture ordinaire assure une ponte régulière et constante.

Th vente partout — 60 cents.

Dr. Ed. Morin & Cie, Limitée, Québec, P.Q.

AU COIN

Histoire du re...
ferme par le

Gestion d... à la fin... vern

Ce soir, dit Long...
jours anxiens de l'en...
la charrette devant les...
fit Sansouci. — Com...
pour te parler de Pl...
tons, je dois, pour é...
ler des soins à donne...
ment. Cette époque...
plus importantes pe...
ge, parce que d'elle...
les bons ou les ma...
l'agelage. Il est ma...
mère importance de...
des brebis en gestat...
tu veux dire, rédui...
ments sans doute. —
Longuevne, car un...
tité de fourrages...
une trop forte pres...
digestifs et pourra...
expulser le fœtus...
celui-ci avance en...
nourriture. Aussi, i...
donner une alimen...
mère. L'éleveur do...
ter avec précaution...
parlant de la vache...
village il faut tenir...
en bon état de for...
ration laxative. —
vraie pour toutes les...
Chez la brebis, on...
adoptant la ration a...
à une demie livre de...
bis, par jour, du mél...
ties d'avoine, 2 parti...
foin, on recommande...
neuses (trèfle). Le...
lement le mélange: e...
est excellent.

Les succulents, e...
les intestins en bon...
Pour ceux qui dis...
devront veiller à ce...
irréprochable. L'ex...
ple, est un aliment...
reux pour les brebis...
cifs se font rapidem...
nisme.

A mesure que la...
il faut suivre le trou...
encore.

Chez la brebis tr...
tion, il faut diminu...
éviter la fièvre du...
Comme pour la ve...
minution doit comm...
jours avant la partu...
jusqu'à quatre ou c...
Il vaut mieux que...
moins de lait les pr...
risse subseq...
que de risquer de la...
progréniture. Si, par...
lait, le pis de la m...
faire accepter le ou...
autre brebis.

A cet effet, on a...
ingrédient à odeur f...
ote, etc., de manièr...
teur. Cet expédi...
très bien. Durant l...
de l'éleveur est très...
Certaines femelle...
aïdes, mais il faut...
délicatement et ne...
tiquement le troupeau...
doit se faire qu'en ca...

Si on fait venir...
bonne heure en jan...
exemple, il est néce...
les brebis portières d...
à l'abri des courants...
d'humidité. Vu les...
présentement pour le...
rait être avantageux...
un agneau qui ayant...
peut être donné à un...

Cependant, seule...
main-d'œuvre, de m...
décider si la chose e...
général, l'animal a...
moins rapides et cert...
nomiques vu le supp...
est requis. Avant de...
peut-être pas inutile...
de connaître l'âge de...
de l'animal est un p...
ans la sélection in...

Si on fait venir...
bonne heure en jan...
exemple, il est néce...
les brebis portières d...
à l'abri des courants...
d'humidité. Vu les...
présentement pour le...
rait être avantageux...
un agneau qui ayant...
peut être donné à un...

Cependant, seule...
main-d'œuvre, de m...
décider si la chose e...
général, l'animal a...
moins rapides et cert...
nomiques vu le supp...
est requis. Avant de...
peut-être pas inutile...
de connaître l'âge de...
de l'animal est un p...
ans la sélection in...

Cependant, seule...
main-d'œuvre, de m...
décider si la chose e...
général, l'animal a...
moins rapides et cert...
nomiques vu le supp...
est requis. Avant de...
peut-être pas inutile...
de connaître l'âge de...
de l'animal est un p...
ans la sélection in...