

symptômes hydrocéphaloides. Le bismuth est aujourd'hui d'un usage presque banal dans la thérapeutique des diarrhées en général, mais peut-être ne réussit-il jamais d'une façon aussi satisfaisante que dans la diarrhée des enfants. On ne doit pas craindre de l'administrer à doses élevées ou fréquemment répétées. Donné de cette manière, il produit les meilleurs résultats. Six ou douze grains forment la dose ordinaire pour un enfant de six à douze mois, mais on peut la pousser bien au-delà. On peut combiner le bismuth soit avec la poudre de craie et opium, soit avec celle de Dower. Lewis Smith le donne en suspension dans un véhicule aqueux, comme suit :

R. Tinet. Opii deodorata gtt xvi
 Bismuthi Subnit ʒij
 Syrupi ʒss
 Aquæ..... ʒiiss

M.—Dose : une cuillerée à thé pour un enfant de un an.

Pour notre part, nous n'avons qu'à nous louer de l'emploi du bismuth dans cette maladie. Jamais il n'a manqué son effet. Sa combinaison avec l'opium n'est pas absolument nécessaire. La Belladone agirait peut-être d'une manière aussi heureuse que le Laudanum, tout en étant moins préjudiciable à l'enfant.

Si la maladie a atteint la période de prostration (hydrocéphaloides), on ne devra donner l'opium qu'avec une extrême prudence, continuant cependant l'administration du bismuth. A cette période les toniques et les astringents seront surtout de mise et la prescription suivante aura de bons effets :

R. Tinet. Calumbæ. ʒij
 Liq ferri nitratis gtt xviii
 Syrupi..... ʒij

M.—Dose : une cuillerée à thé.

En même temps il sera bon d'administrer les stimulants, et entre autres, le brandy, dont la dose varie selon l'âge. Pour un enfant au-dessus d'un an, donnez trois gouttes pour chaque mois de l'âge de l'enfant toutes les deux ou trois heures. Cette dose suffira dans la plupart des cas où l'emploi des stimulants sera indiqué. Certains auteurs recommandent le champagne à la glace, s'il survient des vomissements opiniâtres. Dans ces cas d'irritation stomacale accompagnée de vomissements, l'application d'un sinapisme à l'épigastre, accompagnée ou non de l'injection hypodermique d'une faible dose de morphine, sera suivie d'un soulagement prompt et le plus souvent perma-