

Si la dose injectée suffit, on voit l'état général s'améliorer : le mal de tête et la courbature diminuent, le sommeil revient. La température tombe brusquement de 1 à 1,5, quelquefois davantage, ou revient progressivement vers la normale.

Dans les érysipèles ambulants, la fièvre est parfois tenace et nécessite pour amener sa chute définitive des doses répétées de sérum.

La fréquence et les caractères du pouls suivent une marche parallèle à celle de la température.

L'albumine disparaît des urines chez les malades injectés tardivement et ne se montre pas du tout chez ceux traités au début de l'affection.

L'état local change d'aspect sous l'influence du sérum ; la rougeur et la tuméfaction s'effacent ; les ganglions lymphatiques cessent d'être douloureux et reviennent à leur grosseur normale. La desquamation se montre plus ou moins rapidement suivant le moment de l'intervention.

L'administration de petites doses de sérum injecté préventivement à intervalles réguliers empêche les rechutes qui se répètent chez certains malades avec une opiniâtreté désespérante.

*Inconvénients du sérum :* Au niveau de l'injection, il apparaît, 12 à 20 heures après, une rougeur qui reste localisée ainsi qu'un peu d'œdème. Si le sérum a été injecté dans le tissu cellulaire sous-dermique, la résorption est très rapide et le lendemain de l'injection tout phénomène local a disparu. Si la douleur et le gonflement devenaient trop gênants, l'application loco dolenti, de compresses imbibées d'eau tiède amènerait un soulagement rapide.

Contre l'exanthème qui se montre 4 à 8 jours après l'injection et qui peut revêtir plusieurs formes (urticaire, purpura, érythème polymorphe), on évitera d'employer les bains froids qui exagèrent souvent l'éruption et provoquent des démangeaisons insupportables. Un léger purgatif drastique, quelques centigrammes de calomel par exemple, fera disparaître rapidement ces accidents dont le pronostic n'est jamais alarmant. Il sera bon de recommander au malade pendant toute la durée de cette période, le régime lacté plus ou moins mitigé suivant les circonstances.

Les éruptions au niveau de la peau que l'on constate chez un certain nombre de malades peuvent dépendre d'une part du tempérament de l'individu traité et d'autre part provenir du sérum.

Chez les personnes arthritiques ou prédisposées à cause de