

TRAVAUX ORIGINAUX

DYSPEPSIE INTESTINALE

RAPPORT présenté au V^e Congrès des médecins de langue française de l'Amérique du Nord, tenu à Sherbrooke, les 23, 24, 25 août, 1908, par le Dr Odilon Leclerc, Québec.

La digestion chimique de l'estomac a quelque peu perdu de l'importance qu'elle avait acquise par l'engouement suscité par les travaux d'Hayem et Winter. Van Noorden, Schlatter et plusieurs autres ont démontré que l'absence de l'estomac n'entravait les fonctions de la digestion. Frémont a pu chez le chien isoler l'estomac pour en retirer le suc gastrique et conserver quand même à ses sujets une santé parfaite. C'était une attaque directe contre les idées nouvelles qu'achevèrent de démolir les travaux de Schmidt. La pathologie intestinale à peu près ignorée jusqu'alors s'enrichit de nombreux travaux; de nouveaux procédés tous plus compliqués les uns que les autres sont inventés pour explorer les fonctions intestinales par l'analyse qualitative et quantitative des évacuations.

Mais il faut l'avouer, si les résultats obtenus permettent quelques réactions pratiques à la portée du praticien, ils ne répondent qu'à demi au besoin de la clinique et la dyspepsie intestinale n'est encore à proprement parler qu'une question à l'étude à peine ad-

Syphilis
Artério-sclérose, etc.
(Ioduro-Enzymes)
Todure sans Todisme

Todurase

de COUTURIEUX,
57, Ave. d'Antin, Paris.
en capsules dosées à 50 ctg. d'Io-
dure et 10 ctg. de Levuline.
