

un local isolé. Si un avortement se produit dans l'étable, la vache sera mise à part et séquestrée ; l'avorton et le délivre seront détruits (brûlés ou bouillis) ; on désinfectera tous les objets et les surfaces souillés ; voir *Désinfection des étables*, page 10.

Quant aux vaches ayant cohabité avec la malade, elles devront être soumises, pendant huit jours au moins, aux lavages antiseptiques suivants :

Chaque matin, on lavera soigneusement la queue, l'anus, la vulve, le périnée de chaque bête à l'aide d'une éponge imbibée de l'un des liquides ci-après :

Eau de pluie. 25 chopines
Creoline ou cresyl. 1 chopine

Ou bien :

Eau de pluie. 20 pintes
Acide muriatique, 2 onces liquides, poison, 5 cts
Bichlorure de mercure, $\frac{1}{4}$ d'once, poison, 5 cts

Ou bien encore :

Acide carbolique, 2 onces, 25 cts par la malle.
Eau bouillante. 1 gallon

Une fois par semaine on fera dans le vagin une injection avec une pinte de l'une de ces trois solutions ci-dessus, préalablement tiédie.

Chaque semaine, le sol de l'étable sera gratté, nettoyé à fond et copieusement arrosé avec une solution de sulfate de cuivre (vitriol bleu), une once par 3 demiars d'eau.

Et à toutes les vaches de l'étable, en santé ou non, il sera prudent de donner tous les deux matins, pendant 8 jours, une cuillerée à soupe de *Poudre de condition belge*, page 214.

BLEIME (COR) (CORN)

Causes : — Mauvaise ferrure, coups, blessures, marche trop longue sur un sol dur, introduction d'un corps étranger sous le fer.

Symptômes : — Boiterie, mais plutôt sur un terrain dur que sur un terrain moir. Le cheval se porte sur la pince pour se soulager le talon. La douleur est vive au frapper, et, en grat-