

"Genus *PTEROMALUS* Swederus.

"Caput mandibulis 4-dentatis, sinistra rarissime 3-dentata, genis sæpe compressis, vertice interdum medio acuto; clypeo apice medio plerumque emarginato; oculis interdum hirtis, peristomio sæpe parvo. Antennæ sæpius infra medium faciei convexæ vel interdum protuberantis insertæ, scapo haud brevi, annellis plerumque bene distinctis, clava haud stylata. Thorax haud elongatus, pronoti collari sæpius discreto, sed margine antico haud acute reflexo; metathorace plerumque punctulato, plica sæpius integra, interdum abbreviata sed semper distincta instructo, spiraculis raro magnis, nucha plerumque brevi, calli fimbria sæpe magna. Alæ radio quam metacarpo interdum brevior vel æquali, stigmatibus haud crasso, plerumque. ♂ semper immaculatæ; abdomen sæpe ♀ rotundum, ♂ ventre rarius plica instructo, fasciis nullis determinatus ornatum, segmento 8o ♀ plerumque brevi, 2o haud dense pubescente apice late rotundato. Pedes haud graciles, coxis posticis breviter ovatis, basi postice haud pubescenti." (Thomson, 1878, p. 145.)

The *Conspectus subgenerum* follows on the next page, after a paragraph of remarks; only those portions necessary for our purpose are given in full.

"CONSPECTUS SUBGENERUM.

- A) Oculi hirti. Antennæ incrassatæ. Vertex medio acuto.
 a) *Halizous*.
 aa) *Trichoglenus*.
 B) Oculi glabri.
 b) Antennæ postannello parvo *Meraporus*.
 bb) Antennæ postannello magno.
 c) Metathorax nucha magna subglobosa. Antennæ flagello filiformi. Abdomen ♀ ovato-acutum. Alæ metacarpo quam radio longior.
 d) *Catolaccus*.
 dd) *Pteromalus*.
 cc) Metathorax nucha sæpius minima. Alæ metacarpo quam radio interdum brevior, rarissime longior. Abdomen ♀^a plerumque rotundum. Antennæ infra medium faciei convexæ vel valde prominulæ insertæ.