

FORMULAIRE.

Diarrhée.—*Loomis.*

P.—Teinture d'opium.....	$\frac{1}{2}$ once
Teinture de rhubarbe.....	$\frac{1}{2}$ "
Teinture de cachou comp.....	1 "
Huile ess. de lavande comp	q. s. pour f. 4 onces

M.—Dose : Une drachme fluide, après chaque selle. — *Medical Fortnightly.*

Limonade antidiarrhéique.—*Hayem.*

P.—Acide lactique	10 parties (en poids).
Sirop simple.	200 "
Eau distillée.....	800 "

M.—A prendre par demi verres, en dehors des repas, dans la diarrhée chronique des adultes. L'acide lactique agit comme tonique et germicide.—*Union médicale.*

Diarrhée séreuse.—*Hare.*

P.—Opium.	1 grain.
Acétate de plomb.....	2 grains.
Camphre.....	1 grain.

M.—Pour une pilule, à répéter au besoin toutes les 2, 3 ou 4 heures.—*College and Clinical Record.*

Impuissance.—*W. F. Glenn.*

P.—Chlorure d'or et de sodium.....	3 grs.
Sulfate de strychnine	1 gr.
Phosphate de zinc	3 grs.
Extrait de damiana.....	1 drachme.

M.—Divisez en 30 capsules. Dose : Trois capsules par jour. —*Southern Practitioner.*

Erysipèle.

P.—Tannin en poudre	1 partie.
Camphre en poudre.....	1 "
Ether.....	8 parties.

M.—Appliquer, toutes les deux heures, au moyen d'un pinceau. —*Revue gén. de clinique et de thérap.*