

vemens péristaltiques qui évacuent les matières. Erst aurait pu l'observer à l'écran radio-copique. Ainsi, par insuffisance de la paroi du gros intestin, la défécation peut être plus ou moins troublée. Je dis : plus ou moins, car on a constaté que, même dans les cachexies avancées, cette paroi ne perd guère de sa consistance ; elle est loin de la perdre dans la proportion de la paroi abdominale par exemple. Pourtant ce rôle a été incriminé pour expliquer la constipation atonique des vieillards.

2° — Une *seconde cause* de trouble de la défécation survient quand il existe un *obstacle fonctionnel ou anatomique* au cours normal des matières.

L'obstacle fonctionnel se réalise quand les matières fécales chassées dans l'ampoule rectale ne peuvent en sortir à cause d'un spasme, d'une contracture du sphincter. Celle-ci est due, le plus souvent, à une érosion, une fissure, des hémorroïdes douloureuse. Il suffit de penser à la possibilité de ces désordres pour aussitôt constater s'ils existent ou non.

L'obstacle organique se rencontre dans des adhérences susceptibles de comprimer l'intestin. Une périlonite antérieure chez une femme, comme c'est le cas le plus fréquent, aura laissé ces adhérences.

Quelquefois il s'agit d'une tumeur siégeant sur le gros intestin, un cancer ou des lésions d'origine tuberculeuse ou syphilitique.

Dans ces cas, la constipation s'établit par crises entrecoupées de débâcles diarrhéiques. Quelquefois c'est une occlusion temporaire. Un point sur lequel a insisté M. le Dr Albert Mathieu a rapporté précisément à ce fait que, dans le cancer rectal, ce n'est pas la constipation que l'on observe, mais de fausses diarrhées avec cybales nageant dans du liquide plus ou moins limpide et muqueux. Il faut connaître cette particularité. Il n'y a que les obstacles siégeant plus haut, sur le côlon transverse, qui s'accompagnent de constipation chronique. Elle est alors intense : il s'agit de véritables crises d'occlusion.

Voici donc quelle est la deuxième cause de constipation ; les obstacles fonctionnels ou anatomiques.

3° — On peut voir s'établir la constipation pour une *troisième cause*. Il s'agit de la *mauvaise qualité des matières fécales*. Tout va bien, les contractions sont normales, il n'y a pas d'obstacle à