

LE

Naturaliste Canadien

Vol. II.

Québec, MAI, 1870.

No. 6.

Rédacteur : M. l'Abbé PROVANCHER.

FAUNE CANADIENNE.

LES OISEAUX.

(Continué de la page 128).

3. Le Faucon sacré. *Falco sacer*, Forster. *F. candicans*, Gmel. *F. Islandicus* des auteurs.—Vulg. Gerfaut; Angl. *Gerfalcon*, Labrador *Falcon*.—Longueur 18-20 pouces. Bec brun de plomb; cire, tour des yeux et doigts, jaunes; parties supérieures brunes, barrées et tachées de blanc; parties inférieures blanches, avec taches cordiformes brunes; queue avec bandes alternes claires et foncées; tarses emplumés dans les $\frac{2}{3}$ supérieurs.

H. et Err. Le Gerfaut qui est assez commun au Groënland et au Labrador est très variable dans son plumage, suivant l'âge. D'après l'ornithologiste Américain L. A. Allen, il est constaté aujourd'hui que le *F. Islandicus* des auteurs et le *F. candicans* de Gmelin ne sont qu'une seule et même espèce, à différents âges. Ce faucon niche sur les rochers escarpés, pond 3 à 4 œufs d'un jaune roussâtre clair, avec taches brunes très rapprochées. Ce n'est qu'accidentellement qu'il se montre à Québec dans certains hivers.

4. Le Faucon épervier. *Falco sparverius*, Lin. *F. dominicensis*, Gmel. *F. gracilis*, *cinnamominus*, Sw.—Vulg. *Emérillon*; Angl. *Sparrow-Hawk*.—Longueur 11-12 pouces; ailes 7-7 $\frac{1}{2}$; queue 5-6 pouces. Bec bleu; cire, paupières et pieds jaunes; iris brun-noisette, tête d'un gris bleuâtre avec une bande roussâtre sur le front renfermant les yeux et la gorge. Parties supérieures d'un brun rougeâtre avec des taches brunes; plumes caudales centrées, terminées de blanc, avec une bande noire sub-terminale. 2e et 3e rémiges les plus longues, la 1ère égale à la 4e.