

TRAVAUX ORIGINAUX

NOTES SUR UN FIBRO-SARCÔME DU NERF SCIATIQUE. (1)

Par MM. LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris, et MARIEN (de Montréal).

Nous avons l'honneur de présenter à la Société Anatomique l'observation clinique et les pièces anatomiques d'une énorme tumeur du nerf sciatique. Cette tumeur s'était développée dans la portion fessière de ce nerf et l'observation du malade présente quelques particularités sur lesquelles nous désirons attirer l'attention de la Société.

F. X. homme âgé de 35 ans, se présente le 26 décembre 1895 à la consultation de l'Hôpital St-Louis, et nous consulte pour une tumeur qu'il porte depuis trois mois à la fesse droite. Il ne présente rien de bien intéressant à noter sur ses antécédents personnels et héréditaires.

Très robuste et bien constitué, il avait toujours joui d'une excellente santé jusqu'au mois d'octobre dernier.

À cette époque, son attention fut attirée par une douleur localisée à la fesse droite et qui se manifestait surtout dans la position assise. Il remarqua alors qu'à la suite d'une longue marche ou d'une longue station debout longtemps prolongée il éprouvait de la fatigue beaucoup plus vite, du côté de son membre malade. Il ressentait de plus des engourdissements et des fourmillements dans toute la jambe.

Enfin il ne tarda pas à s'apercevoir d'une grosseur à la fesse, qui devint de plus en plus appréciable et qui fut rapidement très gênante. Il se décida alors à rentrer à l'hôpital pour être opéré.

La région de la fesse droite est saillante, une tumeur du volume d'une tête de fœtus fait fortement bomber les téguments.

Ceux-ci sont intacts, la tumeur est manifestement développée au dessous du muscle fessier. Elle est immobile sur le plan profond, dans le sens vertical, mais légèrement mobile dans le sens transversal. Douleuruse à la pression, surtout au niveau de son extrémité supérieure, de forme un peu allongée, la tumeur présente la régularité, la consistance uniforme et rénitente du sarcôme.

Et le diagnostic porté fut celui de sarcôme du sciatique ou de sarcôme développé aux dépens des muscles pelvi-trochantériens avec compression du sciatique.

L'opération fut pratiquée à St-Louis par notre maître M. Legueu, lorsqu'il prit possession du service de M. Nélaton, au mois de janvier 1896. Voici par

(1) Extrait d'une communication faite à la Société Anatomique de Paris.