

ées se mobilisent et s'éliminent spontanément : chez l'enfant dont je viens de parler, six séquestres furent ainsi exclusés ; dans un autre cas de tumeur blanche fistulisée du coude et d'ostéite également fistulisée du tibia, deux séquestres s'éliminèrent, puis la guérison fut obtenue.

Les résultats fonctionnels ne sont pas moins favorables : en même temps que les lésions rétrocedent et que les fistules se cicatrisent, la mobilité articulaire reparait et, finalement, des malades, qui avaient une ankylose à peu près complète, guérissent en conservant l'intégrité des mouvements de leur jointure. Rollier en rapporte quelques exemples indiscutables, à la hanche, au coude, etc., surtout chez des enfants : tel un sujet de 8 ans, présentant une coxalgie ancienne avec destruction de la tête fémorale, attitude vicieuse en flexion et abcès, qui finit par guérir avec une hanche mobile et sans le moindre raccourcissement.

Les beaux succès obtenus par le chirurgien de Leysin n'ont peut-être pas eu tout le retentissement qu'ils méritent. Mais tous ceux qui eurent l'occasion de visiter sa clinique et d'examiner ses malades furent convaincus. A Vienne, von Eiselsberg, Hochenegg, Jerusalem ont confirmé les bons effets de l'héliothérapie dans la tuberculose ostéo-articulaire.

Tout récemment Bardenheuer, au retour d'un voyage à Leysin, a longuement exposé ce qu'il y avait vu et proclamé sa conversion à la méthode nouvelle. Le mot de "conversion" n'est pas trop fort, si l'on se rappelle que le professeur de Cologne a toujours été un interventionniste ardent en matière de tuberculose articulaire. Lui-même le dit dans un paragraphe qui a toutes les allures d'une profession de foi : "J'ai été un partisan convaincu des résections, aussi bien de la résection du sternum, des côtes adjacentes et des articulations sterno-claviculaires que de la résection totale de la hanche et de l'articulation sacro-iliaque ; j'ai défendu activement la pratique des résections extracapsulaires du cou-de-pied, du tarse, du coude ; néanmoins je crois aujourd'hui, qu'en fait d'articulations tuberculeuses, l'opération peut être le plus souvent évitée si l'on peut envoyer le malade dans un sanatorium d'altitude. En face des résultats de Rollier, la résection est une opération mutilante."

Bardenheuer a fait plus que cette adhésion de principe à la