

lement éviter le froid, mais aussi avoir une hygiène alimentaire sévère, continuer le régime lacté mixte et n'arriver qu'avec prudence à l'alimentation ordinaire.

Pendant la desquamation, des bains sont nécessaires pour aider la chute des squames ; il est recommandé de faire suivre chaque bain d'une lotion antiseptique, pour désinfecter la peau et aussi pour calmer le prurit qui est souvent si désagréable à cette période de la maladie ; on peut faire des lotions avec une des solutions que voici :

Solutions :

Acide acétique cristallisé.....	1 à 2 gr.
Eau	200 —
	(Quinquaud.)
—————	
Hyposulfite de soude.....	15 gr.
Acide phénique cristallisé.....	2 — 50
Glycérine neutre.....	10 —
Eau distillée.....	120 —
	(Johnston),

ou encore faire une onction avec un corps gras antiseptisé, pour empêcher la diffusion des squames. L'asepsie des cavités naturelles devra être recherchée avec soin jusqu'à la fin de la maladie. Les personnes qui soignent les scarlatineux devront prendre les plus grands soins pour se désinfecter et tout ce qui a servi au malade devra, si possible, être passé à l'étuve. Ne pas oublier que la scarlatine est contagieuse tant que toute desquamation n'est pas disparue.

DILATATION DE L'URETHRE

Un grand nombre de femmes qui souffrent d'affections sub-aigües de la vessie, accompagnées de symptômes tels que miction douloureuses, pesanteur, sensation indiquant que la miction n'a pas complètement vidé la vessie, etc., peut être rapidement soulagée par la dilatation de l'urèthre. La plupart des succès que l'on a obtenu par le cystoscope, peuvent être attribués à la dilatation de l'urèthre, qui est nécessaire, pour l'introduction de cet instrument.

The Canada Lancet

IRRITATION DE LA VESSIE

Le Dr C. W. Cutler recommande la préparation suivante comme un moyen certain de soulager les femme enceintes qui souffrent d'irritation de la vessie avec miction fréquente.

Acide Benzoïe	1 drachme
Sodi Borat	$\frac{1}{2}$ drachme
Glycerine	$\frac{1}{2}$ once
Extr-Diasmee Fl	
Aqua. distil	ââ 3 onces

Sig. — Une cuillerée à potage toutes les 3 ou 4 heures.

The Southern Clinic.