qu'à 5 milligrammes chacune. Malheureusement la tuberculine sous cette forme n'a aucune valeur : de plus il est impossible de faire une bonne solution au centième avec ces tablettes parce que la quantité de sucre de lait qui sert de support à la tuberculine est trop considérable ; une certaine quantité de lactose demeure en suspension. Le Dr. Laurendeau a aussi fait des expériences avec une autre tuberculine (Parke Davis) préparée en vue de l'usage vétérinaire ; et il a obtenu de bons résultats avec cette préparation ; mais il existe une objection : c'est qu'elle est douloureuse au moment de l'application dans l'œil, ce qui est attribuable à la glycérine qui sert de véhicule à la toxine.

Vous trouverez sur le marché deux variétés de tuberculine française, du moins quant à la morphologie : la "tuberculin Test" de l'Institut Pasteur de Lille, sous forme de poudre sèche et la "tuberculine", solution mère au centième de l'Institut Pasteur de Paris ; cette dernière est livrée au commerce dans des ampoules de verre contenant un centième cube (15 gts. environ), et se vend un prix très modéré : 30 cts. chacune livrées à Montréal. Les deux ont à peu près la même valeur. La solution en ampoule est beaucoup plus facile à manier : il suffit de briser l'extrémité de l'ampoule, d'y introduire une aiguille hypodermique un peu longue, d'aspirer deux ou trois gouttes de liquide, puis de les déposer dans l'œil du patient à examiner. Si l'on doit procéder à un seul examen, il est important de bien stériliser la balance qui reste dans l'ampoule. A cet effet, comme la tuberculine n'est pas très fragile, l'on conseille dans les instructions qui accompagnent chaque paquet, de fermer l'ampoule à la lampe à alcool, puis de la maintenir dans l'eau bouillante une dizaine de minutes ; mais il est plus pratique d'entourer solidement l'extrémité du col de l'ampoule d'un peu de ouate aseptique, puis de procéder à sa stérilisation en la plaçant dans un vase étroit, afin que la ouate dépasse la surface de l'eau bouillante : l'auteur recommande ce procédé dont il n'a eu qu'à se louer.

Il ne faut pas trop se hâter, lorsqu'il s'agit de consigner l'effet de la tuberculine ; ainsi le Dr. Laurendeau a vu survenir le symptôme caractéristique, c'est-à-dire la congestion conjonctivale, dans un cas, seulement 48 heures après l'installation de la tuberculine, et cela après avoir déclaré à la