

R. RONGEURS OMNIVORES.	{	doigts libres.	{	queue longue, à poils distiques	F. des ECUREUILS.
				queue velue; queue courte ou moyenne, non à poils distiques	F. des MARMOTTES.
	{	queue presque nue	{	membres postérieurs ordinaires	F. des RATS.
				membres postérieurs très longs :	F. des GERBOISES.
				doigts des pieds palmés pour la nage	F. des RATS-NAGEURS.
R. HERBIVORES.	{	4 incisives à la machoire supérieure . .	{	corps armé de piquants . . .	F. des PORCS-EPICS.
				corps non armé de piquants . .	F. des LIÈVRES.
		2 incisives à la machoire supérieure			F. des DASIPOÏDES.

FAM. DES ECUREUILS.

ECUREUILS.	{	bouche avec abajoues, G. <i>Tamias</i> , <i>Tamias</i> .	{	T. a quatre bandes, CC.	
				<i>T. quadrivittata</i> , Less.	
				T. de la Caroline, Ex. lim.	
				<i>T. Caroliniensis</i> , Briss.	
				T. de la Baie d'Hudson, Ex. lim.	
				<i>T. Hudsonia</i> , Less.	
{	Peau des flancs non dilatable en ailes;	bouche sans abajoues, G. Ecureuil, <i>Sciurus</i> .	{	E. de la Baie d'Hudson, CC.	
				<i>S. Hudsonicus</i> , Penn.	
				E. voyageur, R.	
				<i>S. migratorius</i> .	
				E. noir, R.	
				<i>S. niger</i> , Lin.	
{	Peau des flancs dilatable en ailes	G. Polatouche, <i>Sciuropterus</i> .	{	P. volant, AC.	
				<i>S. volucella</i> , Less.	
				P. des montagnes, Ex. lim.	
				<i>S. alpinus</i> .	

FAM. DES MARMOTTES.

MARMOTTES.	{	Corps trapu; tête large et aplatie, sans abajoues, G. Marmotte, <i>Arctomys</i> .	{	M. monax, R.	
				<i>A. monax</i> , Gml.	
				M. de Québec, C.	
				<i>A. empetra</i> , Gml.	
				M. poudrée, Ex. lim.	
				<i>A. Pruinus</i> ,	
{	Corps moyen; tête assez arrondie, abajoues 0, G. <i>Spermophile</i> , <i>Spermophilus</i> .	{	{	S. de la Louisiane, R.	
				<i>S. Ludovicianus</i> , Less.	
				S. de Hood, Ex. lim.	
				<i>S. Hoodii</i> ,	
				S. de Parry, Ex. lim.	
				<i>S. Parryi</i> .	
				S. de Richardson, Ex. lim.	
				<i>S. Richardsonii</i> ,	